




Principio attivo: **INTERFERONE BETA-1a**

Farmaco: AVONEX®

(30 mcg siringhe o penne preimpilate)

E' un farmaco ad alto costo prescrivibile esclusivamente da medici specialisti appartenenti ad Aziende Ospedaliere e alle ASL in cui la Regione ha individuato i centri prescrittori

<p>A COSA SERVE?</p>	<p>Avonex® è un medicinale biologico* contenente l'interferone beta-1a; appartiene ad una classe di medicinali conosciuti come interferoni.</p> <p>Gli interferoni sono prodotti dall'organismo e svolgono un ruolo essenziale nell' aiutarlo a far fronte ad attacchi come le infezioni di natura virale.</p> <p>L'interferone beta-1a è una proteina solubile altamente purificata che è simile all'interferone beta naturale prodotto nel corpo umano.</p> <p>L'interferone beta-1a è indicato per il trattamento della sclerosi multipla (SM). La SM è una malattia di tipo infiammatorio che colpisce il sistema nervoso centrale e si manifesta con la distruzione della guaina protettiva che ricopre le cellule nervose (demyelinizzazione). L'interferone beta-1a si è dimostrato efficace nel ridurre il numero e la gravità delle riacutizzazioni e nel rallentare la progressione della disabilità.</p> <p><i>* Un medicinale biologico è un farmaco il cui principio attivo è una sostanza prodotta, o estratta, da un sistema biologico (di origine umana, animale o da colture cellulari) attraverso procedimenti sofisticati di laboratorio.</i></p>
<p>QUANDO NON LO PUOI UTILIZZARE?</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • se sei allergico all'interferone beta o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (il foglietto illustrativo riporta l'elenco di tutti gli eccipienti); • se sei in gravidanza; • durante l'allattamento al seno; • se sei un paziente che soffre di depressione grave e/o pensieri suicidari
<p>COME E QUANTE VOLTE LO PUOI UTILIZZARE DURANTE LA GIORNATA?</p> 	<p>La penna o la siringa contenente l'interferone beta-1a deve essere somministrata per <u>via intramuscolo</u> una volta a settimana. Cerca di prendere l'interferone beta-1a sempre nello stesso giorno e alla stessa ora.</p> <p>La dose raccomandata è di 30 mcg a settimana (1 penna/siringa a settimana).</p> <p>ATTENZIONE:</p> <p>Lascia penna/siringa a temperatura ambiente per mezz'ora prima dell'iniezione.</p> <p>Il sito raccomandato per l'iniezione intramuscolare è il muscolo esterno della parte superiore della coscia (non eseguire l'iniezione nei glutei).</p> <p>Il sito dell'iniezione deve essere cambiato ogni settimana, per ridurre i rischi di irritazioni cutanee o muscolari.</p> <p>Effetti indesiderati molto comuni sono i sintomi simil-influenzali (mal di testa, dolori muscolari, brividi o febbre) che possono essere ridotti nei modi seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Esegui l'iniezione appena prima di coricarti. Così, quando insorgono gli effetti indesiderati, starai dormendo. 2. Prendi paracetamolo o ibuprofene mezz'ora prima dell'iniezione e continua a prenderli ancora per un giorno. Chiedi al medico o al farmacista la dose più adatta. 3. Se ti viene la febbre, bevi abbondante acqua per mantenere il corpo idratato.
<p>COSA DEVI FARE SE DIMENTICHI DI ASSUMERE UNA DOSE?</p>	<p>Se dimentichi di assumere una dose puoi recuperare quanto prima la dose saltata, poi attendi una settimana dal giorno del recupero. Continua le iniezioni in questo nuovo giorno ogni settimana.</p> <p>Non prendere mai una dose doppia (due dosi nello stesso momento) per compensare quella dimenticata.</p>
<p>DEVI USARE PARTICOLARI METODI CONTRACCETTIVI?</p>	<p>Se sei una donna in età fertile è bene adottare misure contraccettive per tutta la durata del trattamento.</p>

<p>DURANTE IL TRATTAMENTO DEVI FARE CONTROLLI EMATOLOGICI SPECIALISTICI?</p>	<p>Durante il trattamento possono formarsi dei trombi (coaguli di sangue) all'interno dei piccoli vasi sanguigni. Questi trombi potrebbero avere un effetto sui reni. La formazione dei trombi potrebbe avvenire da diverse settimane a diversi anni dall'inizio del trattamento con l'interferone beta-1a.</p> <p>Il medico potrà decidere di sottoporli a controlli della pressione sanguigna, del sangue (conta piastrinica) e della funzione dei reni.</p> <p>Alcuni esami di laboratorio possono mostrare alterazioni: può diminuire il numero dei globuli rossi, dei globuli bianchi o delle piastrine; la funzionalità epatica può essere alterata.</p> <p>Se sei un paziente con mielosoppressione (soppressione dell'attività del midollo osseo) è necessario monitorare in modo più intensivo gli emocromi (conta completa degli elementi del sangue), con conte differenziali (un esame del sangue che quantifica il numero di globuli bianchi) e conta piastrinica (le piastrine sono elementi del sangue che contribuiscono alla coagulazione).</p> <p style="text-align: center;">Chiedi o informati dal tuo medico curante!</p>
<p>L'EVENTUALE INTERRUZIONE DEL TRATTAMENTO LA DEVI FARE A SCALARE?</p>	<p>No, ma è necessario consultare il tuo medico prima di interrompere la terapia.</p>
<p>COSA DEVI FARE IN CASO DI SOVRADOSAGGIO?</p>	<p>Se accidentalmente assumi una dose maggiore di quella raccomandata, consulta immediatamente il medico, il pronto soccorso più vicino o il tuo Centro di Riferimento.</p>
<p>AVONEX® INTERAGISCE CON ALTRI FARMACI?</p> <p></p>	<p>Informa il medico o il farmacista se stai assumendo, o hai assunto (almeno nell'arco degli ultimi 6 mesi) qualsiasi altro medicinale.</p> <p>In particolare informa il medico o il farmacista se ti viene indicato di assumere antiepilettici o antidepressivi perché sono controindicati.</p> <p>L'interferone beta-1a può influenzare l'azione di altri medicinali o esserne influenzato. Questo vale per qualsiasi medicinale, compresi quelli senza obbligo di prescrizione.</p> <p>Per ulteriori informazioni contatta il tuo medico o il farmacista.</p>
<p>QUALI SONO GLI EFFETTI COLLATERALI CHE SI POTREBBERO PRESENTARE?</p>	<p>Informa immediatamente il medico e interrompi il trattamento con interferone beta-1a se manifesti uno qualsiasi dei seguenti gravi effetti indesiderati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reazioni allergiche gravi (gonfiore al viso, labbra o lingua, difficoltà a respirare, arrossamento) - Depressione (sensazione insolita di tristezza, ansia o senso di inutilità) - Disturbi al fegato (ingiallimento della pelle o del bianco degli occhi, prurito diffuso, nausea e vomito, facilità a riportare lividi) <p>Altri effetti indesiderati molto comuni sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Sintomi simil-influenzali (mal di testa, dolori muscolari, brividi o febbre) * Mal di testa. <p>Se si presentano altri disturbi che di solito non hai e pensi possano essere collegati all'uso di questo farmaco, informa il tuo medico e il tuo farmacista!</p> <p>Puoi effettuare anche tu la segnalazione sull'apposita scheda dedicata al "cittadino" scaricabile dal sito dell'AIFA: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/modalità-di-segnalazione-dellespette-reazioni-avverse-ai-medicinali ed inviarla per mail o per fax</p>
<p>COME SI CONSERVA AVONEX®?</p>	<p>Conservare in frigorifero (tra 2°C e 8°C). Non congelare.</p> <p>Una volta preparata la soluzione nella siringa, usala il più presto possibile. La siringa preparata può tuttavia essere conservata in frigorifero (tra 2°C e 8°C) per un massimo di 6 ore prima dell'iniezione.</p> <p>Tenere il farmaco nell'imballaggio esterno per proteggerle dalla luce.</p>

A cura di

Sabrina Amendolagine, Angela Bove, Silvia Buongiorno, Maria Vittoria Lacaita, Cataldo Procacci, Miriam Rizzo

Con il contributo di
Sonia Parazza, Daniela Scala

Si ringrazia Cittadinanzattiva per aver collaborato a rendere il testo di più facile lettura per i cittadini

Ottobre 2017