

Principio attivo: **OMBITASVIR, PARITAPREVIK E RITONAVIR**

Farmaco: **VIEKIRAX®**

(12,5 mg ombitasvir+ 75 mg paritaprevir + 50 mg ritonavir; compresse rivestite con film)

E' un farmaco ad alto costo prescrivibile esclusivamente da medici specialisti appartenenti ad Aziende Ospedaliere e alle ASL in cui la Regione ha individuato i centri prescrittori

<p>A COSA SERVE?</p>	<p>Viekirax® è usato nel trattamento dell'epatite C cronica negli adulti in combinazione con altri medicinali. Contiene i principi attivi ombitasvir, paritaprevir e ritonavir: i primi due bloccano la replicazione del virus, il terzo agisce come "potenziatore" per prolungare l'attività di paritaprevir nel sangue. L'azione combinata delle tre sostanze attive impedisce al virus dell'epatite C di moltiplicarsi e infettare nuove cellule, eliminando così il virus dal sangue dopo un certo periodo di tempo.</p>
<p>QUANDO NON LO PUOI UTILIZZARE?</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Se sei allergico a ombitasvir, paritaprevir, ritonavir o a uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (il foglietto illustrativo riporta l'elenco di tutti gli eccipienti) • Se hai problemi gravi al fegato diversi dall'epatite C • Durante la gravidanza e l'allattamento • Se hai meno di 18 anni <p>Per ulteriori informazioni contatta il tuo medico o il farmacista ospedaliero.</p>
<p>COME E QUANTE VOLTE LO PUOI UTILIZZARE DURANTE LA GIORNATA?</p> 	<p>La dose raccomandata è di due compresse assunte insieme al mattino con il cibo. Deglutisci le compresse intere, non masticare, spezzare o frantumare le compresse perché possono avere un sapore amaro.</p> <p>Viekirax® è assunto con altri medicinali antivirali quali "dasabuvir" e "ribavirina". Esistono vari genotipi del virus dell'epatite C, per cui la combinazione di medicinali da utilizzare e la durata della terapia dipendono dal genotipo* del virus dell'epatite C responsabile dell'infezione, oltre che dalla natura dei problemi epatici a carico del paziente (cirrosi epatica o se il fegato non funziona correttamente).</p> <p>Il medico ti dirà quanto durerà il tuo trattamento (12 o 24 settimane).</p> <p><i>*Il genotipo rappresenta il profilo genetico del virus</i></p>
<p>COSA DEVI FARE SE DIMENTICHI DI ASSUMERE UNA DOSE?</p>	<p>Se dimentichi di assumere una dose e te ne ricordi entro 12 ore dall'orario abituale di assunzione, prendi la dose prescritta. Se sono trascorse più di 12 ore, la dose dimenticata NON deve essere assunta e devi prendere la dose successiva in base allo schema posologico abituale.</p> <p>Non prendere mai una dose doppia (due dosi nello stesso momento) per compensare quella dimenticata.</p>
<p>DEVI USARE PARTICOLARI METODI CONTRACCETTIVI?</p>	<p>In età fertile adotta misure contraccettive efficaci.</p> <p>Se stai assumendo Viekirax® con ribavirina, è bene che tu o il/la tuo/a partner adottiate una misura contraccettiva efficace durante e per 6 mesi dopo la fine del trattamento.</p> <p>Se stai usando una pillola contraccettiva controlla sulla confezione se contiene etinilestradiolo, e informa il medico. E' probabile che tu debba cambiare il contraccettivo, in quanto controindicato.</p>
<p>DURANTE IL TRATTAMENTO DEVI FARE CONTROLLI EMATOLOGICI SPECIALISTICI?</p>	<p>Il medico ti prescriverà delle analisi del sangue prima, durante e dopo il trattamento con Viekirax® per decidere quali altri medicinali puoi assumere in associazione e per quanto tempo, per verificare che il trattamento sia stato efficace, per verificare gli effetti collaterali di Viekirax® o di altri medicinali antivirali assunti in associazione.</p>
<p>L'EVENTUALE INTERRUZIONE DEL TRATTAMENTO LA DEVI FARE A SCALARE?</p>	<p>No, comunque non smettere di prendere questo medicinale fino a quando non Ti sarà indicato dal medico. È molto importante che completi l'intero ciclo di trattamento, in modo da dare al medicinale la miglior possibilità di eliminare l'infezione da virus dell'epatite C.</p>
<p>IN CASO DI SOVRADOSAGGIO COSA DEVI FARE?</p>	<p>Se accidentalmente assumi una dose maggiore di quella raccomandata, consulta immediatamente il medico o dirigiti presso il pronto soccorso più vicino o presso il tuo Centro di Riferimento.</p> <p>Porta con te la confezione del medicinale, in modo da poter spiegare facilmente cosa hai assunto</p>

<p>VIEKIRAX® INTERAGISCE CON ALTRI FARMACI?</p>  	<p>Informa il medico o il farmacista se stai assumendo o hai recentemente assunto qualsiasi altro medicinale. In particolare informa il medico o il farmacista se ti viene indicato di assumere i seguenti farmaci perché sono controindicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alfuzosina (per l'ipertrofia prostatica benigna) • amiodarone, chinidina (per trattare il battito cardiaco irregolare) • atorvastatina, lovastatina, simvastatina (per ridurre i livelli di colesterolo) • carbamazepina, fenitoina, fenobarbitale (per prevenire le crisi epilettiche) • cisapride (per i problemi di stomaco) • claritromicina, telitromicina, acido fusidico (per le infezioni batteriche) • efavirenz, etravirina, lopinavir/ritonavir, saquinavir, tipranavir, nevirapina, indinavir, (per trattare l'infezione da HIV) • cobicistat (per aumentare i livelli di alcuni medicinali usati per l'infezione da HIV) • rifampicina, (per trattare infezioni come la tubercolosi) • conivaptan (per normalizzare livelli bassi di sodio nel sangue) • colchicina (per trattare la gotta) • enzalutamide (per il tumore della prostata) • ergotamina, diidroergotamina, (per il mal di testa) • ergonovina, metilergometrina (durante il parto) • medicinali contenenti etinilestradiolo, come la maggior parte delle pillole anticoncezionali e degli anelli vaginali utilizzati a scopo contraccettivo • itraconozolo, ketoconozolo, posaconazolo, voriconazolo, (per le infezioni fungine); • midazolam, triazolam, (per agevolare il sonno o ridurre l'ansia) • astemizolo, terfenadina, (per le allergie) • pimozone (antispicifico) • mitotane, (per i sintomi dei tumori delle ghiandole surrenaliche) • quetiapina, (per la schizofrenia, il disturbo bipolare e il disturbo depressivo maggiore) • salmeterolo, (per l'asma) • sildenafil, (per trattare l'ipertensione arteriosa polmonare) • erba di San Giovanni (<i>Hypericum perforatum</i>) che è un prodotto erboristico per l'ansia o la depressione) • ticagrelor (impedisce al sangue di coagulare) <p>Per ulteriori informazioni contatta il tuo medico o il farmacista</p>
<p>QUALI SONO GLI EFFETTI COLLATERALI CHE SI POTREBBERO PRESENTARE?</p>	<p>Gli effetti collaterali più comuni sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensazione di stanchezza (fatica). • Sensazione di malessere (nausea). • Prurito. • Difficoltà a dormire (insonnia). • Sensazione di debolezza o perdita di energia (astenia). • Anemia (basso numero di globuli rossi). <p>Se si presentano altri disturbi che di solito non hai e pensi possano essere collegati all'uso di questo farmaco, informa il tuo medico e il tuo farmacista!</p> <p>Puoi effettuare anche tu la segnalazione sull'apposita scheda dedicata al "cittadino" scaricabile dal sito dell'AIFA: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/modalità-di-segnalazione-delle-sospette-reazioni-avverse-ai-medicinali ed inviarla per mail o per fax.</p>
<p>COME SI CONSERVA VIEKIRAX®?</p>	<p>Conservare a temperatura inferiore ai 30° C.</p>

A cura di

Sabrina Amendolagine, Silvia Buongiorno, Maria Vittoria Lacaita, Cataldo Procacci, Miriam Rizzo
Coordinatori: Michele Lattarulo, Maria Ernestina Faggiano

Con il contributo di Sonia Parazza, Rosalba Di Tommaso, Giulia Dusi, Felice Musicco, Domenico Tarantino, Daniela Scala

Si ringrazia Cittadinanzattiva per aver collaborato a rendere il testo di più facile lettura per i cittadini