

RIBOCICLIB (KISQALI®)



Ribociclib è indicato, in associazione a un inibitore dell'aromatasi o a fulvestrant, per il trattamento del carcinoma mammario. Ciascuna compressa rivestita contiene 200 mg di principio attivo.

Come si prende?

La dose raccomandata è di 600 mg (tre compresse rivestite da 200 mg) da assumere una dopo l'altra una volta al giorno per 21 giorni consecutivi seguiti da 7 giorni di pausa dal trattamento, in modo da costituire un ciclo di 28 giorni.

La dose prescritta potrebbe subire variazioni in quanto il dosaggio può essere personalizzato per il singolo paziente. La gestione delle reazioni avverse può, inoltre, richiedere la riduzione della dose, la sospensione o l'interruzione del trattamento.

Le compresse possono essere assunte con o senza cibo, mantenendo approssimativamente ogni giorno la stessa ora di assunzione, preferibilmente al mattino.

SI RICORDI DI LAVARE LE MANI DOPO
AVER TOCCATO LE COMPRESSE!

Cosa fare se si dimentica una dose?

Se vomita o salta involontariamente una dose, non deve assumere una dose supplementare nella stessa giornata. La dose del giorno successivo deve essere assunta alla solita ora.



Le compresse si possono frantumare?

Le compresse rivestite di ribociclib devono essere ingerite intere: non devono essere masticate, frantumate o divise prima di essere degluite. Non deve essere ingerita alcuna compressa che sia rotta, danneggiata o comunque non integra.

Come lo conservo?

Questo medicinale non richiede alcuna speciale condizione di conservazione.

Lo conservi nella confezione originale insieme al foglietto illustrativo, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di luce e calore.

Avvertenze

Ogni compressa di ribociclib contiene 0,344 mg di lecitina di soia. Se è ipersensibile ad arachidi o soia non deve assumere questo medicinale.

Posso assumere altri farmaci?

Prima di assumere qualsiasi farmaco, comprese sostanze naturali, omeopatici e integratori, chiedi sempre consiglio al tuo medico e farmacista.

Si raccomanda, inoltre, di evitare il consumo di pompelmo o succo di pompelmo e di prodotti a base di iperico (Erba di San Giovanni).

Posso guidare durante il trattamento con ribociclib?

Ribociclib ha una minima influenza sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Alcuni effetti indesiderati del farmaco possono, però, influenzare queste attività: non si metta alla guida nel caso in cui non si senta totalmente sicuro.



Effetti indesiderati

Il trattamento con ribociclib potrebbe causarle dei disturbi. Dal momento che gli effetti avversi dei farmaci sono molto soggettivi, non è detto che questi si verifichino in lei.

I disturbi che più comunemente si manifestano con ribociclib sono:

- ☐ infezioni;
- ☐ neutropenia, leucopenia, anemia;
- ☐ alopecia, prurito, eruzione cutanea;
- ☐ cefalea, capogiri;
- ☐ dispnea, tosse;
- ☐ disturbi gastrointestinali, diminuzione dell'appetito;
- ☐ mal di schiena;
- ☐ edema periferico;
- ☐ stanchezza, astenia, ipertensione;
- ☐ alterazione dei test di funzionalità epatica.

Si ricordi che è importante riferire sempre al suo medico qualsiasi sintomo, anche quando questo è considerato un sintomo comunemente correlato alla terapia che sta assumendo!

Smaltimento

Se si trova nelle condizioni di dover smaltire il farmaco, si ricordi di gettarlo SOLO negli appositi contenitori per farmaci scaduti.

Data di assunzione

Ora

N⁰ cp. assunte

Come mi sento oggi?

Effetti collaterali*

[illegible]

***Informi il suo medico curante e il farmacista ospedaliero**