

## PAZOPANIB (VOTRIENT®)



Pazopanib è indicato nel trattamento del carcinoma renale e del sarcoma dei tessuti molli.

In commercio sono presenti compresse da 200 mg e da 400 mg. È possibile che debba assumere una combinazione di compresse per raggiungere il dosaggio desiderato.

### Come si prende?

Pazopanib è per uso orale e deve essere assunto senza cibo (almeno 1 ora prima o 2 ore dopo un pasto) in un'unica somministrazione giornaliera. Assuma le compresse una dopo l'altra con un bicchiere di acqua. Una volta scelto un orario di assunzione cerchi di variarlo il meno possibile.

La dose raccomandata è di 800 mg una volta al giorno, ma la dose prescritta potrebbe subire variazioni in quanto il dosaggio può essere personalizzato per il singolo paziente. La gestione delle reazioni avverse può, inoltre, richiedere la riduzione della dose, la sospensione o l'interruzione del trattamento.

SI RICORDI DI LAVARE LE MANI DOPO  
AVER TOCCATO LE COMPRESSE!

### Cosa fare se si dimentica una dose?

Se dimentica una dose di pazopanib non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza, ma attenda e assuma la dose successiva prevista all'ora usuale.



### Le compresse si possono frantumare?

Le compresse devono essere assunte intere con acqua, non devono essere spezzate o frantumate.

### Come lo conservo?

Questo medicinale non richiede alcuna speciale condizione di conservazione. Lo conservi nella confezione originale insieme al foglietto illustrativo, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di luce e calore.

### Posso assumere altri farmaci?

Prima di assumere qualsiasi farmaco, comprese sostanze naturali, omeopatici e integratori, chiedi sempre consiglio al tuo medico e farmacista. Si raccomanda, inoltre, di evitare l'assunzione di pompelmo e succo di pompelmo.

### Posso guidare durante il trattamento con pazopanib?

Pazopanib non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti negativi su tali attività non possono essere previsti sulla base della farmacologia di pazopanib, ma deve evitare di guidare veicoli o di usare macchinari se si sente confuso, stanco o debole.

## Effetti indesiderati



Il trattamento con pazopanib potrebbe causarle dei disturbi. Dal momento che gli effetti avversi dei farmaci sono molto soggettivi, non è detto che questi si verifichino in lei.

I disturbi che più comunemente si manifestano con pazopanib sono:

- ☐ infezioni;
- ☐ diminuzione dell'appetito;
- ☐ disgeusia (alterazione del senso del gusto);
- ☐ cefalea;
- ☐ ipertensione;
- ☐ nausea, vomito, diarrea, dolore addominale;
- ☐ cambiamento del colore dei capelli, alopecia;
- ☐ rash cutaneo (arrossamento della cute frequentemente associato ad infiammazione);
- ☐ eritrodismestesia palmo-plantare (arrossamento e/o desquamazione della pelle del palmo delle mani e dei piedi);
- ☐ proteinuria (presenza di quantità superiori alla norma di proteine nelle urine);
- ☐ affaticamento;
- ☐ aumento dell'alanina aminotransferasi, aumento dell'aspartato aminotransferasi (alterazione di enzimi epatici).

Si ricordi che è importante riferire sempre al suo medico qualsiasi sintomo, anche quando questo è considerato un sintomo comunemente correlato alla terapia che sta assumendo!

### Smaltimento

Se si trova nelle condizioni di dover smaltire il farmaco, si ricordi di gettarlo SOLO negli appositi contenitori per farmaci scaduti.

CON IL PATROCINIO DI



SOCIETÀ ITALIANA DI FARMACIA  
OSPEDALIERA E DEI SERVIZI FARMACEUTICI  
DELLE AZIENDE SANITARIE


## Data di assunzione

Ora

**N<sup>0</sup> cp. assunte**

## Come mi sento oggi?

## Effetti collaterali\*

[illegible]

**\*Informi il suo medico curante e il farmacista ospedaliero**