

EVEROLIMUS (AFINITOR®)



Everolimus è indicato per il trattamento del carcinoma mammario, del carcinoma renale e dei tumori neuroendocrini. In commercio sono presenti compresse da 2,5 mg, 5 mg o 10 mg.

Come si prende?

Everolimus deve essere assunto per via orale una volta al giorno alla stessa ora, regolarmente, con o senza cibo.

La dose raccomandata è di 10 mg (una compressa) una volta al giorno, ma la dose prescritta potrebbe subire variazioni in quanto il dosaggio può essere personalizzato per il singolo paziente; la gestione delle reazioni avverse può, inoltre, richiedere la riduzione della dose, la sospensione o l'interruzione del trattamento.

SI RICORDI DI LAVARE LE MANI DOPO
AVER TOCCATO LE COMPRESSE!

Cosa fare se si dimentica una dose?

Se dimentica una dose non deve assumere una dose aggiuntiva, ma attendere e riprendere il normale schema di assunzione all'ora stabilita.



Le compresse si possono frantumare?

Le compresse di everolimus devono essere inghiottite intere con un bicchiere d'acqua e non devono essere masticate o frantumate.

Come lo conservo?

Questo medicinale non deve essere conservato a temperature superiori ai 25°C.

Lo conservi nella confezione originale insieme al foglietto illustrativo, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di luce e calore.

Posso assumere altri farmaci?

Prima di assumere qualsiasi farmaco, comprese sostanze naturali, omeopatici e integratori, chiedi sempre consiglio al tuo medico e farmacista.

Si raccomanda, inoltre, di evitare il consumo di pompelmo, succo di pompelmo e prodotti a base di iperico (Erba di San Giovanni).

Posso guidare durante il trattamento con everolimus?

Everolimus altera lievemente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Alcuni effetti indesiderati del farmaco possono, però, influenzare queste attività: non si metta alla guida nel caso in cui non si senta totalmente sicuro.



Effetti indesiderati

Il trattamento con everolimus potrebbe causarle dei disturbi. Dal momento che gli effetti avversi dei farmaci sono molto soggettivi, non è detto che questi si verifichino in lei.

I disturbi che più comunemente si manifestano con everolimus sono:

- infezioni;
- anemia;
- disturbi gastrointestinali;
- iperglicemia, ipercolesterolemia;
- stomatite, alterazione del gusto, diminuzione dell'appetito;
- perdita di peso;
- cefalea, affaticamento, astenia;
- epistassi (sanguinamento dal naso);
- tosse;
- edema periferico;
- rash cutaneo (arrossamento della cute frequentemente associato ad infiammazione);
- prurito.

Si ricordi che è importante riferire sempre al suo medico qualsiasi sintomo, anche quando questo è considerato un sintomo comunemente correlato alla terapia che sta assumendo!

Smaltimento

Se si trova nelle condizioni di dover smaltire il farmaco, si ricordi di gettarlo SOLO negli appositi contenitori per farmaci scaduti.

CON IL PATROCINIO DI

