

RUXOLITINIB (JAKAVI®)



Ruxolitinib è indicato per:

- ❖ il trattamento della splenomegalia o dei sintomi correlati alla malattia in pazienti adulti con mielofibrosi;
 - ❖ il trattamento di pazienti adulti con policitemia vera che sono resistenti o intolleranti a idrossiurea.
- In commercio sono presenti compresse con dosaggi da 5 mg, 10 mg, 15 mg e 20 mg.

Come si prende?

Le compresse devono essere deglutite intere con un po' di acqua. Devono essere assunte due volte al giorno, preferibilmente ogni giorno alla stessa ora, per via orale, con o senza cibo.

Prima dell'inizio del trattamento con ruxolitinib il suo medico effettuerà degli esami del sangue per determinare la dose iniziale necessaria. Avrà bisogno di fare ulteriori esami del sangue durante il trattamento per valutare se sarà necessario modificare la dose o sospendere il farmaco.

SI RICORDI DI LAVARE LE MANI DOPO
AVER TOCCATO LE COMPRESSE!

Cosa fare se si dimentica una dose?

Se dimentica di prendere una compressa non assuma una dose doppia di ruxolitinib per compensare la dose dimenticata, bensì assuma semplicemente la dose successiva alla solita ora.



Le compresse si possono frantumare?

Le compresse devono essere deglutite intere con acqua e non devono essere masticate o frantumate.

Come lo conservo?

Questo medicinale non deve essere conservato a temperature superiori ai 30°C. Lo conservi nella confezione originale insieme al foglietto illustrativo, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di luce e calore.

Posso assumere altri farmaci?

Prima di assumere qualsiasi farmaco, comprese sostanze naturali, omeopatici e integratori, chiedi sempre consiglio al tuo medico e farmacista. Durante il trattamento con ruxolitinib risulta, inoltre, necessario evitare il consumo di Erba di San Giovanni (Hypericum perforatum).

Posso guidare durante il trattamento con ruxolitinib?

Ruxolitinib ha un effetto sedativo nullo o trascurabile. Tuttavia, i pazienti che accusano capogiri dopo l'assunzione devono astenersi dal guidare veicoli o dall'utilizzare macchinari.

Effetti indesiderati



Il trattamento con ruxolitinib potrebbe causarle dei disturbi. Dal momento che gli effetti avversi dei farmaci sono molto soggettivi, non è detto che questi si verifichino in Lei.

I disturbi che più comunemente si manifestano con ruxolitinib sono:

- ☐ infezioni del tratto urinario;
- ☐ abbassamento dei globuli rossi, globuli bianchi e piastrine;
- ☐ sanguinamenti, lividi;
- ☐ aumento di peso;
- ☐ aumento del colesterolo e dei trigliceridi nel sangue;
- ☐ capogiri, mal di testa;
- ☐ possibile alterazione degli esami del fegato;
- ☐ aumento della pressione arteriosa.

Si ricordi che è importante riferire sempre al suo medico qualsiasi sintomo, anche quando questo è considerato un sintomo comunemente correlato alla terapia che sta assumendo!

Smaltimento

Se si trova nelle condizioni di dover smaltire il farmaco, si ricordi di gettarlo SOLO negli appositi contenitori per farmaci scaduti.

CON IL PATROCINIO DI



SOCIETÀ ITALIANA DI FARMACIA
OSPEDALIERA E DEI SERVIZI FARMACEUTICI
DELLE AZIENDE SANITARIE

