

LAPATINIB (TYVERB®)



Lapatinib è indicato nel trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma mammario che sovraesprime il recettore 2 per il fattore di crescita epidermico umano (HER2).

In commercio sono presenti compresse da 250 mg.

Come si prende?

La dose raccomandata di Lapatinib da assumere in un'unica soluzione è:

❖ 1250 mg (5 compresse) se prescritto in associazione a capecitabina;

❖ 1000 mg (4 compresse) se prescritto in associazione a trastuzumab;

❖ 1500 mg (6 compresse) se prescritto in associazione a un inibitore dell'aromatasi.

La dose prescritta potrebbe subire variazioni in quanto il dosaggio può essere personalizzato per il singolo paziente. La gestione delle reazioni avverse può, inoltre, richiedere la riduzione della dose, la sospensione o l'interruzione del trattamento.

La dose giornaliera di lapatinib non deve essere suddivisa e le compresse devono essere assunte intere una dopo l'altra almeno 1 ora prima o almeno 1 ora dopo l'assunzione di cibo, mantenendo ogni giorno la stessa modalità di assunzione.

SI RICORDI DI LAVARE LE MANI DOPO
AVER TOCCATO LE COMPRESSE!

Cosa fare se si dimentica una dose?

Se vomita o salta involontariamente una dose, non deve assumere una dose supplementare nella stessa giornata. La dose del giorno successivo deve essere assunta alla solita ora.



Le compresse si possono frantumare?

Le compresse rivestite di lapatinib devono essere ingerite intere: non devono essere masticate, frantumate o divise prima di essere degluite.

Come lo conservo?

Questo medicinale non deve essere conservato a temperature superiori ai 30°C. Lo conservi nella confezione originale insieme al foglietto illustrativo, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di luce e calore.

Posso assumere altri farmaci?

Prima di assumere qualsiasi farmaco, comprese sostanze naturali, omeopatici e integratori, chiedi sempre consiglio al tuo medico e farmacista.

Si raccomanda, inoltre, di evitare il consumo di pompelmo o succo di pompelmo e di prodotti a base di Iperico (erba di San Giovanni).

Posso guidare durante il trattamento con lapatinib?

Lapatinib ha una minima influenza sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Alcuni effetti indesiderati del farmaco possono, però, influenzare queste attività: non si metta alla guida nel caso in cui non si senta totalmente sicuro.



Effetti indesiderati

Il trattamento con lapatinib potrebbe causarle dei disturbi. Dal momento che gli effetti avversi dei farmaci sono molto soggettivi, non è detto che questi si verifichino in lei.

I disturbi che più comunemente si manifestano con lapatinib sono:

- ☐ disturbi gastrointestinali;
- ☐ anoressia;
- ☐ dolore alle estremità, artralgia, lombalgia;
- ☐ tosse, dispnea;
- ☐ epistassi (sanguinamento dal naso);
- ☐ rash cutaneo cutaneo (arrossamento della cute frequentemente associato ad infiammazione);
- ☐ secchezza della cute, alopecia, prurito;
- ☐ affaticamento, astenia;
- ☐ insonnia;
- ☐ cefalea;
- ☐ vampate di calore.

Si ricordi che è importante riferire sempre al suo medico qualsiasi sintomo, anche quando questo è considerato un sintomo comunemente correlato alla terapia che sta assumendo!

Smaltimento

Se si trova nelle condizioni di dover smaltire il farmaco, si ricordi di gettarlo SOLO negli appositi contenitori per farmaci scaduti.

CON IL PATROCINIO DI



SOCIETÀ ITALIANA DI FARMACIA
OSPEDALIERA E DEI SERVIZI FARMACEUTICI
DELLE AZIENDE SANITARIE

