

## CERITINIB (ZYKADIA®)



Ceritinib è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK). In commercio è presente il dosaggio da 150 mg.

### Come si prende?

Le capsule di ceritinib devono essere assunte per via orale una volta al giorno con cibo, ogni giorno alla stessa ora.

È importante che sia assunto con il cibo per raggiungere l'esposizione appropriata (per cibo si può intendere un pasto leggero o completo). La dose raccomandata di ceritinib è di 450 mg che corrispondono a 3 capsule al giorno assunte in un'unica somministrazione, ma, in base alla sicurezza e alla tollerabilità individuali, la dose può essere ridotta e/o il farmaco sospeso.

SI RICORDI DI LAVARE LE MANI DOPO  
AVER TOCCATO LE CAPSULE!

### Cosa fare se si dimentica una dose?

Se dimentica di assumere una dose, deve recuperarla a meno che la dose successiva non sia prevista entro le 12 ore.

Se si verifica vomito durante il corso del trattamento, non deve assumere una dose aggiuntiva, ma deve continuare con la dose successiva programmata per il giorno seguente.



### Le capsule si possono aprire?

Le capsule devono essere deglutite intere con acqua e non devono essere masticate o frantumate.

### Come lo conservo?

Questo medicinale non richiede alcuna speciale condizione di conservazione. Lo conservi nella confezione originale insieme al foglietto illustrativo, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di luce e calore.

### Posso assumere altri farmaci?

Prima di assumere qualsiasi farmaco, comprese sostanze naturali, omeopatici e integratori, chieda sempre consiglio al suo medico e farmacista. Durante il trattamento con ceritinib risulta, inoltre, necessario evitare il consumo di pompelmo e di succo di pompelmo.

### Posso guidare durante il trattamento con ceritinib?

Durante il trattamento deve essere usata cautela quando si guidano veicoli o si usano macchinari poiché ceritinib può causare affaticamento o disturbi della visione.

## Effetti indesiderati



Il trattamento con ceritinib potrebbe causarle dei disturbi. Dal momento che gli effetti avversi dei farmaci sono molto soggettivi, non è detto che questi si verifichino in lei.

I disturbi che più comunemente si manifestano con ceritinib sono:

- ☐ anemia;
- ☐ diminuzione dell'appetito;
- ☐ diarrea, nausea, vomito, dolore addominale, stipsi;
- ☐ eruzioni cutanee;
- ☐ dispepsia, malattia da reflusso gastro-esofageo, disfagia;
- ☐ stanchezza;
- ☐ alterazione dei test epatici di laboratorio;
- ☐ diminuzione del peso;
- ☐ aumento della creatinemia.

Si ricordi che è importante riferire sempre al suo medico qualsiasi sintomo, anche quando questo è considerato un sintomo comunemente correlato alla terapia che sta assumendo!

### Smaltimento

Se si trova nelle condizioni di dover smaltire il farmaco, si ricordi di gettarlo SOLO negli appositi contenitori per farmaci scaduti.

CON IL PATROCINIO DI

