

NILOTINIB (TASIGNA®)



Nilotinib è indicato per il trattamento di pazienti con leucemia mieloide cronica (LMC) con cromosoma Philadelphia positivo. Le capsule presenti in commercio sono da 150 mg e da 200 mg.

Come si prende?

Nilotinib va assunto due volte al giorno a distanza di circa 12 ore a stomaco vuoto (non si deve assumere cibo nelle 2 ore precedenti l'assunzione della dose e non deve essere assunto cibo per almeno 1 ora dopo l'assunzione della dose). Le capsule rigide devono essere inghiottite intere con acqua. La dose raccomandata è 300 mg (2 capsule da 150 mg) o 400 mg (2 capsule da 200 mg) due volte al giorno (4 capsule in totale ogni giorno), ma la dose prescritta potrebbe subire variazioni in quanto il dosaggio può essere personalizzato per il singolo paziente. La gestione delle reazioni avverse può, inoltre, richiedere la riduzione della dose, la sospensione o l'interruzione del trattamento.

SI RICORDI DI LAVARE LE MANI DOPO
AVER TOCCATO LE CAPSULE!

Cosa fare se si dimentica una dose?

Se una dose viene omessa, non deve assumere una dose aggiuntiva, ma attendere ed assumere la successiva dose abituale prescritta.



Le capsule si possono aprire?

Se non riesce a deglutire le capsule rigide, queste possono essere aperte e il contenuto di ciascuna può essere disperso in un cucchiaino da tè di passata di mela (purea di mela) e assunto immediatamente.

Non deve essere utilizzato più di un cucchiaino da tè di passata di mela e nessun altro cibo oltre alla passata di mela.



Come lo conservo?

Questo medicinale non deve essere conservato a temperature superiori ai 30°C.

Lo conservi nella confezione originale insieme al foglietto illustrativo, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di luce e calore.

Posso assumere altri farmaci?

Prima di assumere qualsiasi farmaco, comprese sostanze naturali, omeopatici e integratori, chiedi sempre consiglio al tuo medico e farmacista. Si raccomanda, inoltre, di evitare l'assunzione di pompelmo o succo di pompelmo e prodotti a base di iperico (Erba di San Giovanni).

Posso guidare durante il trattamento con nilotinib?

Nilotinib non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Tuttavia, se dovesse accusare capogiri, astenia, alterazione della vista o altri effetti indesiderati con un potenziale impatto sulla capacità di guidare o di utilizzare macchinari in modo sicuro deve astenersi da queste attività fino a quando gli effetti indesiderati persistono.

Effetti indesiderati



Il trattamento con nilotinib potrebbe causarle dei disturbi. Dal momento che gli effetti avversi dei farmaci sono molto soggettivi, non è detto che questi si verifichino in lei.

I disturbi che più comunemente si manifestano con nilotinib sono:

- ☐ cefalea;
- ☐ nausea, dolore addominale;
- ☐ eruzione cutanea, prurito, alopecia;
- ☐ dolori muscolari;
- ☐ stanchezza;
- ☐ ipofosfatemia, iperbilirubinemia;
- ☐ aumento dell'alanina aminotransferasi, aumento dell'aspartato aminotransferasi, aumento della lipasi, aumento delle lipoproteine del colesterolo, aumento del colesterolo totale, aumento della trigliceridemia.

Si ricordi che è importante riferire sempre al suo medico qualsiasi sintomo, anche quando questo è considerato un sintomo comunemente correlato alla terapia che sta assumendo!

Smaltimento

Se si trova nelle condizioni di dover smaltire il farmaco, si ricordi di gettarlo SOLO negli appositi contenitori per farmaci scaduti.

CON IL PATROCINIO DI



SOCIETÀ ITALIANA DI FARMACIA
OSPEDALIERA E DEI SERVIZI FARMACEUTICI
DELLE AZIENDE SANITARIE

Data di assunzione

Ora

N⁰ cp. assunte

Come mi sento oggi?

Effetti collaterali*

[illegible]

*Informi il suo medico curante e il farmacista ospedaliero