



DEFERASIROX (EXJADE®)

Deferasirox è indicato per il trattamento del sovraccarico cronico di ferro: contiene il principio attivo deferasirox che è un "chelante del ferro". Ciò significa che Exjade si lega al ferro presente nell'organismo per formare un "chelato" che può essere escreto dall'organismo, principalmente attraverso le feci, aiutando a correggere il sovraccarico di ferro. In commercio sono presenti compresse rivestite con film con dosaggi da 90 mg, 180 mg e 360 mg.

Come si prende?

Le compresse rivestite con film devono essere deglutite intere con un po' di acqua. Devono essere assunte una volta al giorno, preferibilmente ogni giorno alla stessa ora, a stomaco vuoto (almeno 1h prima o 2h dopo un pasto) o con un pasto leggero.

Il dosaggio di Exjade che le viene prescritto dipende dal suo peso corporeo, dalla quantità di ferro presente nel sangue, dalla buona funzionalità del fegato e dei reni e dalla quantità di emotrasfusioni a cui è sottoposto.

Cosa fare se si dimentica una dose?

Se dimentica di prendere una dose, la prenda appena si ricorda durante quel giorno. Prenda la dose successiva come previsto. Non prenda una dose doppia il giorno seguente per compensare la dimenticanza della(e) compressa(e).



Le compresse si possono frantumare?

Per i pazienti che non riescono a ingerire le compresse intere, le compresse rivestite con film possono essere frantumate e somministrate spargendo la dose completa su cibo morbido, ad esempio yogurt o passata di mela (purea di mela). La dose deve essere consumata immediatamente e completamente, e non conservata per un utilizzo futuro.

Come lo conservo?

Questo medicinale non richiede alcuna speciale condizione di conservazione.

Lo conservi nella confezione originale insieme al foglietto illustrativo, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di luce e calore.

Posso assumere altri farmaci?

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Le ricordiamo in particolare che non è possibile assumere altri chelanti del ferro e antiacidi contenenti alluminio in concomitanza con deferasirox.

Poiché vi sono altri medicinali per i quali bisogna prestare attenzione a possibili interazione (ad esempio alcuni antidolorifici, alcuni antinfiammatori, etc.) si raccomanda, in ogni caso, di consultare il foglietto illustrativo di deferasirox.

Effetti indesiderati

Il trattamento con deferasirox potrebbe causarle dei disturbi. Dal momento che gli effetti avversi dei farmaci sono molto soggettivi, non è detto che questi si verifichino in Lei.



I disturbi che più comunemente si manifestano con deferasirox sono:

- ☐ alterazione dei test di funzionalità dei reni;
- ☐ disturbi gastrointestinali come nausea, vomito, diarrea, dolore addominale, gonfiore, stipsi, indigestione;
- ☐ eruzioni cutanee, prurito;
- ☐ mal di testa;
- ☐ alterazione dei test di funzionalità epatica.

Si ricordi che è importante riferire sempre al suo medico qualsiasi sintomo, anche quando questo è considerato un sintomo comunemente correlato alla terapia che sta assumendo!

Smaltimento

Se si trova nelle condizioni di dover smaltire il farmaco, si ricordi di gettarlo SOLO negli appositi contenitori per farmaci scaduti.

Data di assunzione

Ora

N^0 cp. assunte

Come mi sento oggi?

Effetti collaterali*

[illegible]

***Informi il suo medico curante e il farmacista ospedaliero**