

DABRAFENIB (TAFINLAR®)



Dabrafenib in monoterapia o in associazione con trametinib è indicato per il trattamento di pazienti adulti con melanoma positivo alla mutazione BRAF V600. In commercio sono presenti capsule da 50 mg e da 75 mg.

Come si prende?

Si raccomanda di assumere le dosi di dabrafenib intere con acqua alla stessa ora ogni giorno, con un intervallo di circa 12 ore tra le dosi.

Dabrafenib deve essere assunto a stomaco vuoto (almeno 1 ora prima o almeno 2 ore dopo un pasto).

La dose raccomandata di dabrafenib, usato sia in monoterapia che in associazione con trametinib, è di due capsule da 75 mg due volte al giorno (corrispondente ad una dose totale giornaliera di 300 mg).

La dose prescritta potrebbe subire variazioni in quanto il dosaggio può essere personalizzato per il singolo paziente. La gestione delle reazioni avverse può, inoltre, richiedere la riduzione della dose, la sospensione o l'interruzione del trattamento.

SI RICORDI DI LAVARE LE MANI DOPO
AVER TOCCATO LE CAPSULE!

Cosa fare se si dimentica una dose?

Se dimentica una dose sopprimerla alla dimenticanza solo se mancano più di 6 ore alla dose successiva prevista. In seguito alla dimenticanza, riadattare gli orari di assunzione del farmaco mantenendo sempre un intervallo di 12 ore prima dell'assunzione delle capsule successive.

Se vomita dopo l'assunzione di dabrafenib non assuma nuovamente il farmaco, ma aspetti e prenda la successiva dose prevista.



Le capsule si possono aprire?

Le capsule devono essere deglutite intere con acqua. Le stesse non devono essere masticate o aperte e non devono essere mescolate con cibo o liquidi a causa dell'instabilità chimica di dabrafenib.

Come lo conservo?

Questo medicinale non richiede alcuna speciale condizione di conservazione.

Lo conservi nella confezione originale insieme al foglietto illustrativo, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di luce e calore.

Posso assumere altri farmaci?

Prima di assumere qualsiasi farmaco, comprese sostanze naturali, omeopatici e integratori, chiedi sempre consiglio al tuo medico e farmacista.

Prima di assumere qualsiasi farmaco, comprese sostanze naturali, omeopatici e integratori, chiedi sempre consiglio al tuo medico e farmacista.

Si raccomanda, inoltre, di evitare il consumo di prodotti a base di iperico (Erba di San Giovanni).

Posso guidare durante il trattamento con dabrafenib?

Dabrafenib può alterare la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari per la possibilità che affaticamento e problemi agli occhi influenzino queste attività.



Effetti indesiderati

Il trattamento con dabrafenib potrebbe causarle dei disturbi. Dal momento che gli effetti avversi dei farmaci sono molto soggettivi, non è detto che questi si verifichino in lei.

I disturbi che più comunemente si manifestano con dabrafenib sono:

- ☐ riduzione dell'appetito;
- ☐ cefalea;
- ☐ tosse;
- ☐ nausea, vomito, diarrea;
- ☐ ipercheratosi, alopecia, rash, sindrome mani-piedi;
- ☐ artralgia, mialgia, dolore alle estremità;
- ☐ piressia, brividi;
- ☐ affaticamento, astenia.

Si ricordi che è importante riferire sempre al suo medico qualsiasi sintomo, anche quando questo è considerato un sintomo comunemente correlato alla terapia che sta assumendo!

Smaltimento

Se si trova nelle condizioni di dover smaltire il farmaco, si ricordi di gettarlo SOLO negli appositi contenitori per farmaci scaduti.

CON IL PATROCINIO DI



SOCIETÀ ITALIANA DI FARMACIA
OSPEDALIERA E DEI SERVIZI FARMACEUTICI
DELLE AZIENDE SANITARIE

