

TRAMETINIB (MEKINIST®)



Trametinib in monoterapia o in associazione con dabrafenib è indicato per il trattamento di pazienti adulti con melanoma positivo alla mutazione BRAF V600. In commercio sono presenti compresse da 0,5 mg e da 2 mg.

Come si prende?

Trametinib deve essere assunto per via orale con un bicchiere pieno d'acqua, senza cibo (almeno 1 ora prima o 2 ore dopo il pasto).

Si raccomanda di assumere la dose di trametinib alla stessa ora ogni giorno.

Quando trametinib e dabrafenib sono assunti in associazione, la dose singola giornaliera di trametinib deve essere presa alla stessa ora ogni giorno o con la dose del mattino o con la dose della sera di dabrafenib.

La dose raccomandata è di 2 mg una volta al giorno, ma la dose prescritta potrebbe subire variazioni in quanto il dosaggio può essere personalizzato per il singolo paziente. La gestione delle reazioni avverse può, inoltre, richiedere la riduzione della dose, la sospensione o l'interruzione del trattamento.

SI RICORDI DI LAVARE LE MANI DOPO
AVER TOCCATO LE COMPRESSE!

Cosa fare se si dimentica una dose?

Se una dose di trametinib viene dimenticata, deve essere assunta solo se mancano più di 12 ore alla dose successiva prevista. In seguito alla dimenticanza, riadattare gli orari di assunzione del farmaco mantenendo sempre un intervallo di 24 ore prima dell'assunzione della compressa successiva.

Se vomita dopo l'assunzione di trametinib, non deve riprendere la dose ma deve attendere e prendere la dose successiva prevista.



Le compresse si possono frantumare?

Le compresse devono essere deglutite intere con acqua. Le stesse non devono essere masticate o schiacciate.

Come lo conservo?

Trametinib va conservato tra 2 e 8 °C.

Una volta aperto, il flacone può essere conservato per massimo 30 giorni a non più di 30 °C.

Oggi le è stato consegnato in una busta termica con un siberino per il trasporto a casa.

Appena arrivato presso la sua abitazione tolga la confezione del farmaco dalla busta e la ponga in frigorifero avendo cura che sia fuori dalla portata dei bambini.

Posso assumere altri farmaci?

Prima di assumere qualsiasi farmaco, comprese sostanze naturali, omeopatici e integratori, chiedi sempre consiglio al tuo medico e farmacista.

Posso guidare durante il trattamento con trametinib?

Trametinib altera lievemente la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

Alcuni effetti indesiderati del farmaco quali affaticamento, capogiri o problemi agli occhi possono influenzare queste attività: non si metta alla guida nel caso in cui non si senta totalmente sicuro.

Effetti indesiderati



Il trattamento con trametinib potrebbe causarle dei disturbi. Dal momento che gli effetti avversi dei farmaci sono molto soggettivi, non è detto che questi si verifichino in lei.

I disturbi che più comunemente si manifestano con trametinib sono:

- ☐ diminuzione dell'appetito;
- ☐ emorragie: sanguinamento nasale, feci frammiste a sangue, sanguinamento gengivale, urine ematiche, emorragia rettale, emorroidale, gastrica, vaginale, congiuntivale, intracranica e post intervento;
- ☐ diarrea, nausea, vomito, stipsi, dolore addominale;
- ☐ bocca secca;
- ☐ edema periferico;
- ☐ piressia, brividi;
- ☐ affaticamento, astenia;
- ☐ nasofaringite, tosse;
- ☐ rash, dermatite acneiforme, cute secca, prurito, alopecia.

Si ricordi che è importante riferire sempre al suo medico qualsiasi sintomo, anche quando questo è considerato un sintomo comunemente correlato alla terapia che sta assumendo!

Smaltimento

Se si trova nelle condizioni di dover smaltire il farmaco, si ricordi di gettarlo SOLO negli appositi contenitori per farmaci scaduti.

CON IL PATROCINIO DI



SOCIETÀ ITALIANA DI FARMACIA
OSPEDALIERA E DEI SERVIZI FARMACEUTICI
DELLE AZIENDE SANITARIE

