



ELTROMBOPAG (REVOLADE®)

Eltrombopag è indicato:

- ❖ per il trattamento della trombocitopenia immune primaria (ITP) in pazienti di età superiore a 1 anno;
 - ❖ per il trattamento della trombocitopenia in pazienti adulti affetti da infezione cronica da virus dell'epatite C (Hepatitis C virus, HCV) quando il grado di trombocitopenia è il principale fattore che impedisce l'inizio o limita la possibilità di mantenere la terapia ottimale basata sull'interferone;
 - ❖ in pazienti adulti affetti da anemia aplastica acquisita grave (SAA) refrattari a precedente terapia immunosoppressiva o fortemente pretrattati e non eleggibili al trapianto di cellule staminali.
- In commercio sono presenti compresse rivestite con dosaggi da 25 mg e da 50 mg.

Come si prende?

Le compresse rivestite con film devono essere deglutite intere con un po' di acqua. Le compresse devono essere assunte almeno due ore prima o quattro ore dopo qualsiasi prodotto come antiacidi, prodotti caseari (o altri prodotti alimentari contenenti calcio), o supplementi minerali contenenti cationi polivalenti (ad esempio ferro, calcio, magnesio, alluminio, selenio e zinco). Il cibo a basso contenuto di calcio (calcio <50 mg), compresi frutta, prosciutto crudo, manzo e succo di frutta non fortificato (senza aggiunta di calcio, magnesio o ferro), latte di soia non fortificato e grano non fortificato non modifica, invece, l'assorbimento del farmaco. Il dosaggio richiesto di eltrombopag deve essere personalizzato sulla base della conta piastrinica del paziente.

SI RICORDI DI LAVARE LE MANI DOPO
AVER TOCCATO LE COMPRESSE!



Cosa fare se si dimentica una dose?

Se dimentica una dose, non cerchi di recuperarla, ma si limiti a prendere la dose successiva all'ora consueta.



Le compresse si possono frantumare?

Le compresse devono essere deglutite intere con acqua e non devono essere masticate o frantumate.

Come lo conservo?

Questo medicinale non richiede alcuna speciale condizione di conservazione. Lo conservi nella confezione originale insieme al foglietto illustrativo, in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di luce e calore.

Posso assumere altri farmaci?

Prima di assumere qualsiasi farmaco, comprese sostanze naturali, omeopatici e integratori, chiedi sempre consiglio al tuo medico e farmacista. Presti attenzione ad assumere eltrombopag almeno 2 ore prima o 4 ore dopo:

- ❖ antiacidi a base di idrossido di alluminio, carbonato di magnesio;
- ❖ integratori minerali contenenti ferro, calcio, magnesio, alluminio, selenio e zinco.

Posso guidare durante il trattamento con eltrombopag?

Eltrombopag altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Nel caso di capogiri e mancanza di vigilanza eviti di svolgere attività che richiedono giudizio, abilità motorie e cognitive.

Effetti indesiderati



Il trattamento con eltrombopag potrebbe causarle dei disturbi. Dal momento che gli effetti avversi dei farmaci sono molto soggettivi, non è detto che questi si verifichino in Lei.

I disturbi che più comunemente si manifestano con eltrombopag sono:

- ☐ nausea;
- ☐ diarrea;
- ☐ cataratta;
- ☐ secchezza dell'occhio;
- ☐ inconsueta perdita o radezza dei capelli;
- ☐ eruzione cutanea;
- ☐ prurito;
- ☐ dolore muscolare, spasmi muscolari;
- ☐ mal di schiena;
- ☐ dolore alle ossa;
- ☐ formicolio e intorpidimento delle mani o dei piedi;
- ☐ ciclo mestruale abbondante;
- ☐ ulcere della bocca;
- ☐ aumento degli enzimi del fegato;
- ☐ aumento della bilirubina.

Si ricordi che è importante riferire sempre al suo medico qualsiasi sintomo, anche quando questo è considerato un sintomo comunemente correlato alla terapia che sta assumendo!

Smaltimento

Se si trova nelle condizioni di dover smaltire il farmaco, si ricordi di gettarlo SOLO negli appositi contenitori per farmaci scaduti.

CON IL PATROCINIO DI



SOCIETÀ ITALIANA DI FARMACIA
OSPEDALIERA E DEI SERVIZI FARMACEUTICI
DELLE AZIENDE SANITARIE

Data di assunzione

Ora

N⁰ cp. assunte

Come mi sento oggi?

Effetti collaterali*

[illegible]

*Informi il suo medico curante e il farmacista ospedaliero