



“TAVOLA SINOTTICA VACCINI ANTI COVID-19”

	COMIRNATY® (PFIZER)	MODERNA
<u>Caratteristiche medicinale</u>		
Da diluire	Sì	No
Temperatura di conservazione del vial	-70°C	-20°C (non conservare a T<-40°C; non utilizzare ghiaccio secco)
Periodo di validità	6 mesi	7 mesi
Volume iniziale vial	0,45mL	5mL + overfill volume
N. dosi per vial	Fino a 6 dosi	10 dosi
Volume finale dopo diluizione	2,25 mL (diluire con 1,8 mL soluzione fisiologica)	NON DILUIRE (farmaco già pronto per essere somministrato)
Volume da somministrare	0,3 mL	0,5 mL
Packaging secondario	195 vials/confezione (229x229x40mm; 2,1 L) Pari a: 975-1170 dosi	10 vials/confezione (140x56x64mm; 0,5 L) Pari a: 100 dosi
Packaging terziario	5 confezioni	12 confezioni
<u>Modalità di conservazione</u>		
Stabilità a 2-8°C	<ul style="list-style-type: none">• Non Diluito: Max 5 giorni• Diluito: Max 6 ore	Max 30 giorni
Stabilità 8-25°C	-	Max 12h
Stabilità 8-30°C	<ul style="list-style-type: none">• Non Diluito: Max 2 ore• Diluito: Max 6 ore	-
Stabilità 2-25°C dopo primo prelievo	-	Max 6 ore
<u>Allestimento</u>		
Mescolamento	Lento capovolgimento (10 volte) del flacone prima e dopo diluizione	Rotazione manuale (10 volte) tenendo il vial dalla parte superiore
Aspetto soluzione allestita	Dispersione biancastra priva di particelle visibili.	Dispersione biancastra con possibile particolato prodotto-relato
<u>Somministrazione</u>		
Età soggetti	≥ 16 anni	≥18 anni
Sito iniezione	Deltoide IM	Deltoide IM
Richiamo seconda dose	Dopo 21 giorni	Dopo 28 giorni
Immunità completa prevista	Non prima di 7 giorni dalla seconda dose	Non prima di 14 giorni dalla seconda dose