

“TAVOLA SINOTTICA VACCINI ANTI COVID-19”

	COMIRNATY® (PFIZER)	MODERNA	ASTRAZENECA
<u>Caratteristiche medicinale</u>			
Da diluire	Sì	No	No
Temperatura di conservazione del vial	-70°C	-20°C (non conservare a T<-40°C; non utilizzare ghiaccio secco)	2-8°C (non congelare)
Periodo di validità	6 mesi	7 mesi	6 mesi
Volume iniziale vial	0,45mL	5mL + overfill volume	5ml overfill volume
N. dosi per vial	Fino a 6 dosi	Fino a 11 dosi	Fino a 11 dosi
Volume finale dopo diluizione	2,25 mL (diluire con 1,8 mL soluzione fisiologica)	NON DILUIRE (farmaco già pronto per essere somministrato)	NON DILUIRE (farmaco già pronto per essere somministrato)
Volume da somministrare	0,3 mL	0,5 mL	0,5 mL
Packaging secondario	195 vials/confezione (229x229x40mm; 2,1 L)	10 vials/confezione (140x56x64mm; 0,5 L)	10 vials/confezione (135x55x55; 0,4L)
Packaging terziario	Pari a: 975-1170 dosi 5 confezioni	Pari ad almeno 100 dosi 12 confezioni	Pari ad almeno 100 dosi 18/20confezioni
<u>Modalità di conservazione</u>			
Stabilità a 2-8°C	<ul style="list-style-type: none"> Non Diluito: Max 5 giorni Diluito: Max 6 ore 	Max 30 giorni	<ul style="list-style-type: none"> 6 mesi 48 ore (dopo primo prelievo)
Stabilità 8-25°C	-	Max 12h	-
Stabilità 8-30°C	<ul style="list-style-type: none"> Non Diluito: Max 2 ore Diluito: Max 6 ore 	-	Max 6 ore
Stabilità 2-25°C dopo primo prelievo	-	Max 6 ore	-



<u>Allestimento</u>			
<i>Mescolamento</i>	Lento capovolgimento (10 volte) del flacone prima e dopo diluizione	Rotazione manuale (10 volte) tenendo il vial dalla parte superiore	Non agitare
<i>Aspetto soluzione allestita</i>	Dispersione biancastra priva di particelle visibili.	Dispersione biancastra con possibile particolato prodotto-relato	Sospensione da incolore a leggermente marrone, da limpida a leggermente opaca
<u>Somministrazione</u>			
<i>Età soggetti</i>	≥ 16 anni	≥18 anni	≥18 anni
<i>Sito iniezione</i>	Deltoide IM	Deltoide IM	Deltoide IM
<i>Richiamo seconda dose</i>	Dopo 21 giorni	Dopo 28 giorni	Dopo 28 o 84 giorni (preferibilmente 70 giorni)
<i>Immunità completa prevista</i>	Non prima di 7 giorni dalla seconda dose	Non prima di 14 giorni dalla seconda dose	Non prima di 15 giorni dalla seconda dose