

## MODELLO PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO TERAPEUTICO

VONCENTO - B02BD06 – Fattore Von Willebrand e fattore VIII in associazione

### Indicazioni terapeutiche

- Malattia di von Willebrand (VWD)  
Trattamento dell'emorragia o prevenzione e trattamento del sanguinamento chirurgico in pazienti con VWD, quando il solo trattamento con desmopressina (DDAVP) sia inefficace o controindicato.
- Emofilia A (carenza congenita del FVIII)  
Profilassi e trattamento dell'emorragia nei pazienti con emofilia A.

### Paziente

Cognome \_\_\_\_\_ / Nome \_\_\_\_\_

Data di nascita (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ / Sesso M  F

### Diagnosi

### Farmaco prescritto

- VONCENTO 250 UI / 600 UI polvere e solvente per soluzione per iniezione/infusione
- VONCENTO 500 UI / 1200 UI polvere e solvente per soluzione per iniezione/infusione
- VONCENTO 1000 UI / 2400 UI polvere e solvente per soluzione per iniezione/infusione

### Posologia:

### Durata prevista del trattamento:

Prima prescrizione

Proseguimento del trattamento

*Il trattamento della malattia di VWD e dell'emofilia A deve essere iniziato sotto la supervisione di un medico esperto nel trattamento dei disordini dell'emostasi.*

*La decisione che un singolo paziente possa eseguire a domicilio il trattamento dei sanguinamenti in caso di pazienti con VWD, e la profilassi e il trattamento delle emorragie in caso di pazienti con emofilia A, deve essere presa dal medico che deve inoltre assicurare al paziente un appropriato addestramento e monitorarne periodicamente la correttezza del trattamento domiciliare.*

Timbro e firma del medico prescrittore	Timbro del Centro
Prof. Xxxxx XXXXXXXX Telefono XX XXXX XXX XXX	Dettagli del centro Numero di riferimento regionale Telefoni

Data (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_