Corso ECM
Ruolo della galenica clinica nella continuità ospedale-territorio
Padova, 5 ottobre 2017

Aspetti farmacologici,
clinico-tossicologici
e terapeutici della *Cannabis*

Roberto Padrini

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI MEDICINA
DIMED

Tipi di *Cannabis*

Sativa

Indica

Ruderalis

CARATTERISTICHE della CANNABIS prodotta dallo Stabilimento Farmaceutico Militare di Firenze (FM-2)

Materiale biologico (*Cannabis sativa*):

infiorescenze femminili, essiccate e macinate (granulometria < 4 mm)

Composti presenti:

quantità:

Precursori acidi di:

a) Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC)

5-8%

b) Cannabidiolo (CBD)

7,5-12%

c) Tetraidrocannabivarina (THCV)

d) Cannabigerolo

e) Cannabicromene

< 1%

Formulazioni di cannabis legalmente disponibili in Italia

<https://www.farmagalenica.it>

PRODOTTO	contenuto		tipo di <i>cannabis</i>
	THC	CBD	
Bedrocan	22%	<1%	<i>sativa</i>
Bediol	6%	8%	<i>sativa</i>
Bedica	14%	<1%	<i>indica</i>
Bedrobinol	12%	<1%	<i>sativa</i>
Bedrolite	<0.4%	9%	<i>sativa</i>
FM2	5-8%	7.5-12%	<i>sativa</i>

RECETTORI dei CANNABINOIDI: (accoppiati a proteine G inibitorie)

Struttura dei recettori CB1 • e CB2 •

Effetti non cannabinoidi (THC):

- inibizione recettori-canale $5HT_{3a}$
- inibizione canali del Ca^{+2} tipo N e P/Q
- attivazione canali del K^{+}
- potenziamento recettori-canale della glicina
- attivazione recettori PPAR- γ

Bersagli farmacologici del THC

CB1 neuronali (presinaptici):

Inibiscono il rilascio di mediatori

- eccitatori (glutamato)
- inibitori (GABA)

CB2 nel sistema immunitario:

- inibiscono la migrazione dei neutrofili
- inibiscono il rilascio di $INF-\gamma$

Recettore non cannabinoidi GPR-55 (lisofosatidil-inositolo):

Modula:

- metabolismo energetico
- riassorbimento osseo
- oncogenesi

ENDOCANNABINOIDI (agonisti endogeni CB1/CB2)

Arachidonylethanolamide (anandamide)

Lipidi di membrana

2-Arachidonylglycerol

Aumento dei livelli di anandamide nei pazienti schizofrenici.

Il blocco dei recettori CB1 (rimonabant) può provocare depressione e casi di suicidio.

Palmitylethanolamide

**Delta-9-tetraidrocannabinolo
(THC)**

AGONISTA PARZIALE
dei recettori **CB1** e **CB2**

Può agire come antagonista nei confronti dei cannabinoidi endogeni nelle aree a bassa densità o attività recettoriale.

Agonista del recettore GPR-55

L'effetto farmacologico finale dipende anche dal tipo di mediatore di cui viene inibito il rilascio:

- eccitatorio (glutamato)
- inibitorio (GABA)

Nell'uso prolungato si sviluppa tolleranza alla maggior parte degli effetti. Basso il rischio di dipendenza fisica e psichica.

THC

EFFETTI FARMACOLOGICI

EFFETTI INDESIDERATI

sensazione di benessere, euforia riduzione ansia, induzione sonno intensificazione delle percezioni sensoriali	Effetti psicotomimetici	disforia, spersonalizzazione ansia, panico, spossatezza allucinazioni, aggravamento psicosi
analgesia effetto antiemetico aumento dell'appetito effetto miorelassante	SNC	inibizione della memoria a breve termine alterazione della coordinazione motoria catalessia
riduzione pressione intraoculare	Occhio	arrossamento congiuntiva riduzione flusso lacrimale
tachicardia vasodilatazione	Sist. Cardiovascolare	Ipotensione ortostatica
broncodilatazione	Sist. Respiratorio	
	Sist. Gastrointestinale	ridotta salivazione ridotto svuotamento gastrico e transito int.
effetti anti-infiammatori	Sist. Immunitario	depressione immunità umorale e cellulare

**Bassa affinità per i
recettori CB1 e CB2**

**Agonista inverso CB1/CB2
Antagonista GPR-55**

Non ha effetti psicotropi e analgesici diretti

Antagonizza alcuni effetti indesiderati del THC (ansia, psicosi, tachicardia)

Potenzia alcuni effetti del THC (analgesia)

Aumenta il tono degli endocannabinoidi

Stimola i recettori della serotonina 5-HT_{1A}

Blocca il reuptake di adenosina

Effetti antiinfiammatori :

- riduce le citochine (TNF- α , IL-6, IL-1 β)
- inibisce la migrazione dei neutrofili e della microglia
- effetti antiossidanti, anti-ROS

Effetti antiepilettici, antipsicotici, antiemetici, neuroprotettivi

**Tetrahydrocannabivarin
(THCV)**

ANTAGONISTA recettori **CB1**

AGONISTA PARZIALE
dei recettori **CB2**

Non ha effetti psicotropi

Non ha effetti anoressizzanti (a differenza del rimonabant)

Migliora la resistenza all'insulina (topi obesi)

Effetti antiepilettici (convulsioni da pentilenterazolo)

FARMACOCINETICA del THC **somministrazione e.v.**

Table IV. Pharmacokinetic data for Δ^9 -tetrahydrocannabinol

Subjects	Dose (mg)	AUC ($\mu\text{g} \cdot \text{min/L}$)	C_{max} ($\mu\text{g/L}$)	$t_{1/2\beta}$ (h)	Vd (L)	CL (ml/min)	References
Intravenous							
4 nonusers	0.5			57 ± 4	658 ± 174		57
5 regular users	0.5			27 ± 1	597 ± 76		57
6 males (drug free)	2			19.6 ± 4.1	626 ± 296	605 ± 149	32
6 males (long-term)	2			18.7 ± 4.2	742 ± 331	977 ± 304	32
6 males	4		70 ± 30	36	734 ± 444	248 ± 62	31
6 females	2.2		85 ± 26	29	523 ± 217	197 ± 50	31
11 males	5	4330 ± 620	161-316				37, 39
9 heavy users	5	4300 ± 1670	288 ± 119				38
9 light users	5	6040 ± 2.21	302 ± 95				38
5 heavy users	5	5180 ± 830		>20		980 ± 150	42
4 light users	5	5460 ± 1180		>20		950 ± 200	42
4 heavy users	5	9908 ± 3785	438 ± 36	1.9 ± 0.3	75 ± 16	777 ± 690	33
4 light users	5	7094 ± 2248	386 ± 29	1.6 ± 0.5	74 ± 35	771 ± 287	33

Clin Pharmacokinet 2003; 42 (4): 327-360

FARMACOCINETICA del THC somministrazione orale e inalatoria

Table IV. Pharmacokinetic data for Δ^9 -tetrahydrocannabinol

Subjects	Dose (mg)	AUC ($\mu\text{g} \cdot \text{min/L}$)	C_{max} ($\mu\text{g/L}$)	$t_{1/2\beta}$ (h)	Vd (L)	CL (ml/min)	References
Oral							
6 males	20		14.5 ± 9.7	25			31
6 females	15		9.4 ± 4.5	25			31
11 males	20	1020 ± 320	4.4–11				37, 39
3 males	3×15		4–6				46
3 males, 3 females	15		3–5				46
20 AIDS patients	2×2.5		2.01 (0.58–12.48)				44
7 men, 10 women	10	610 ± 310	4.7 ± 3.0				41
Inhalational							
11 males	19	1960 ± 650	33–118				37, 39
9 heavy users	19	2160 ± 1030	98 ± 44				38
9 light users	19	1420 ± 740	67 ± 38				38
5 heavy users	10	2450 ± 530					42
4 light users	10	1420 ± 340					42
6 males	15.8		84 (50–129)				35
6 males	33.8		162 (76–267)				35

Clin Pharmacokinet 2003; 42 (4): 327-360

BIODISPONIBILITA' orale e inalatoria del THC

Table III. Systemic bioavailability of Δ^9 -tetrahydrocannabinol (THC)

Subjects	Systemic bioavailability (%)		Formulation	Reference
	average	range		
Oral				
11 frequent or infrequent users	6 ± 3	4–12	THC in chocolate cookie	39
6 men, 6 women	10-20		THC in sesame oil	31
7 men, 10 women	7 ± 3	2–14	THC in sesame oil	41
Inhalational				
9 heavy users	23 ± 6	6–56	Marijuana cigarette	38
9 light users	10 ± 7	2–22	Marijuana cigarette	38
5 heavy users	27 ± 10	16–39	Marijuana cigarette	42
4 light users	14 ± 1	13–14	Marijuana cigarette	42
11 frequent or infrequent users	18 ± 6	8–24	THC in cigarette	39
Rectal				
2 patients with spasticity	190–220% of oral bioavailability		Suppository with THC-hemisuccinate	25

Metaboliti attivi circolanti del THC
(formati da: *CYP2C9*, *CYP3A4*)

11-OH-THC (più attivo del THC)

Somministrazione **e.v** di **1mg** di **THC** e **11-OH-THC**
(9 fumatori occasionali di marijuana)

Dose orale di 15mg THC
in 6 pazienti oncologici

Sigaretta di cannabis contenente
circa **34 mg** di THC (6 soggetti)

Effetti psicotropi del THC in base alla via di somministrazione

IMPIEGHI MEDICI della CANNABIS (DM 9 novembre 2015):

Studi non conclusivi sull'efficacia, di qualità scarsa o moderata

“...l'uso medico della *cannabis* può essere considerato un trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard, quando questi non hanno prodotto gli effetti desiderati o hanno provocato effetti secondari non tollerabili o necessitano di incrementi posologici che potrebbero determinare la comparsa di effetti collaterali”

1. Patologie neurologiche associate a spasticità muscolare dolorosa.
(sclerosi multipla o lesioni midollo spinale)
2. Analgesia nel dolore cronico, in particolare neuropatico.
3. Nausea, vomito da chemio- o radioterapia.
4. Anoressia e cachessia in pazienti oncologici, affetti da HIV o anoressia nervosa.
5. Glaucoma cronico.
6. Sindrome di Gilles de la Tourette (riduzione movimenti involontari).

La Regione Veneto autorizza la prescrizione gratuita di *cannabis* solo per il **dolore cronico** di intensità medio-elevata (punteggio **NRS ≥ 5**) nelle seguenti patologie:

- Sclerosi multipla
- Lesioni del midollo spinale
- Dolore neuropatico
- Dolore oncologico

La formulazione autorizzata di **FM-2 è un decotto** di infiorescenze:

- via orale: 500mg in 500 ml di acqua, bollitura x 15 min.
- via inalatoria: 200mg in 500 ml di acqua, bollitura x 15 min.

QUESITI APERTI

Quale è il reale contenuto in principi attivi e la reale biodisponibilità orale e inalatoria di una soluzione acquosa?

Gli studi pubblicati hanno usato veicoli lipidici per via orale e fumo di sigaretta per la via inalatoria.

Il prodotto industriale registrato per via oro-mucosale (Sativex) è in realtà una soluzione alcolica al 50% + glicole propilenico.

Le modalità, la frequenza di somministrazione e la dose massima non sono specificate ma lasciate alla discrezione medico curante.

Quali sono i criteri per personalizzare la dose?

Quale monitoraggio degli effetti terapeutici o indesiderati è necessario?

Sono necessari studi clinici controllati per valutare la farmacocinetica, l'efficacia e la tollerabilità delle formulazioni acquose autorizzate.