

Principio attivo: **CERTOLIZUMAB PEGOL**

Farmaco: **CIMZIA®**

(200 mg/ml siringa preriempita sottocutanea)

E' un farmaco ad alto costo prescrivibile esclusivamente da medici specialisti appartenenti ad Aziende Ospedaliere e alle ASL in cui la Regione ha individuato i centri proscrittori

| | |
|---|--|
| <p>A COSA SERVE?</p> | <p>Certolizumab pegol è un medicinale biologico* che blocca l'attività di una proteina responsabile dell'infiammazione.</p> <p>Certolizumab pegol è utilizzato per il trattamento dell'artrite reumatoide, della spondiloartrite assiale attiva e dell'artrite psoriasica attiva in pazienti adulti, quando altri medicinali falliscono nel controllare i sintomi. Certolizumab pegol è normalmente utilizzato insieme ad un altro medicinale chiamato metotressato. Se il medico ritiene che il metotressato sia inappropriato, certolizumab pegol può essere dato da solo.</p> <p><i>* Un medicinale biologico è un prodotto il cui principio attivo è una sostanza prodotta, o estratta, da un sistema biologico (di origine umana, animale o da colture cellulari) attraverso procedimenti sofisticati di laboratorio.</i></p> |
| <p>QUANDO NON LO PUOI UTILIZZARE?</p>  | <ul style="list-style-type: none"> • Se sei allergico a certolizumab pegol o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (il foglietto illustrativo riporta l'elenco di tutti gli eccipienti). • Se hai un'infezione grave, inclusa la tubercolosi attiva. • Se hai un'insufficienza cardiaca da moderata a grave. Consulta il medico se hai o hai avuto una grave malattia del cuore. • Gravidanza. <p>Non è noto se certolizumab pegol passi nel latte materno: rivolgiti al medico prima di allattare durante il trattamento con questo medicinale.</p> <p>Per ulteriori informazioni contatta il tuo medico o il farmacista.</p> |
| <p>COME E QUANTE VOLTE LO PUOI UTILIZZARE DURANTE LA GIORNATA?</p>  | <p>La dose iniziale per gli adulti è di 400 mg somministrati alla settimana zero, alla seconda e poi alla quarta settimana. A ciò segue una dose di mantenimento di 200 mg ogni due settimane.</p> <p>Normalmente certolizumab pegol viene somministrato da un medico specialista o da un operatore sanitario qualificato. Dopo un adeguato addestramento, il medico potrebbe anche permetterti di autoiniettarti certolizumab pegol.</p> <p>L'iniezione viene effettuata sotto la pelle, nella pancia o nella coscia.</p> |
| <p>COSA DEVI FARE SE DIMENTICHI DI ASSUMERE UNA DOSE?</p> | <p>Se dimentichi l'appuntamento per l'assunzione di certolizumab pegol prendi un altro appuntamento il prima possibile.</p> <p>Se ti autoinietti certolizumab pegol e dimentichi una dose, devi iniettarti la successiva dose appena te ne ricordi. In seguito, iniettati le dosi successive come ti era stato indicato dal medico.</p> |
| <p>DEVI UTILIZZARE PARTICOLARI MISURE CONTRACCETTIVE?</p> | <p>In età fertile devi adottare precauzioni contraccettive sicure per tutta la durata del trattamento e per almeno cinque mesi dopo l'ultimo trattamento con certolizumab pegol.</p> |
| <p>L'EVENTUALE INTERRUZIONE DEL TRATTAMENTO LA DEVI FARE A SCALARE?</p> | <p>No, ma devi consultare il medico prima di interrompere la terapia.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>IN CASO DI SOVRADOSAGGIO QUALI SINTOMI POTRESTI AVERE?</p> | <p>In caso di somministrazione di un dosaggio maggiore a quello dovuto, non sono stati evidenziati effetti collaterali gravi.</p> <p>Contatta il tuo medico o il farmacista in caso di sovradosaggio.</p> |
| <p>CIMZIA® INTERAGISCE CON ALTRI FARMACI?</p> <p></p> | <p>Certolizumab pegol non deve essere preso in concomitanza con farmaci contenenti come principio attivo anakinra o abatacept.</p> <p>Alcuni tipi di vaccini non devono essere somministrati mentre sei in trattamento con certolizumab pegol.</p> <p>Per ulteriori informazioni contatta il tuo medico o il farmacista.</p> |
| <p>QUALI SONO GLI EFFETTI COLLATERALI CHE SI POTREBBERO PRESENTARE?</p> | <p>Contatta IMMEDIATAMENTE il medico se manifesti uno dei seguenti effetti indesiderati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eruzione cutanea grave, pomfi o altri segni di reazione allergica • gonfiore al viso, alle mani, ai piedi • difficoltà a respirare, ad inghiottire • respiro corto sotto sforzo o a riposo o gonfiore ai piedi • sintomi di disturbi del sangue come febbre persistente, lividi, sanguinamento, pallore. <p>Contatta il PRIMA POSSIBILE il medico se manifesti uno qualunque dei seguenti effetti indesiderati: segni di infezione (febbre, malessere, ferite, problemi dentali, bruciore nell'urinare), sensazione di debolezza o di stanchezza, tosse, formicolio, intorpidimento, visione sdoppiata, debolezza delle braccia o delle gambe, gonfiore o piaga aperta che non guarisce.</p> <p>Puoi effettuare anche tu la segnalazione sull'apposita scheda dedicata al "cittadino" scaricabile dal sito dell'AIFA: http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/modalità-di-segnalazione-delle-sospette-reazioni-avverse-ai-medicinali ed inviandolo per mail o per fax.</p> <p>Se si presentano altri disturbi che di solito non hai e pensi possano essere collegati all'uso di questo farmaco, informa il tuo medico e il tuo farmacista!</p> |
| <p>COME DEVI CONSERVARE CIMZIA®?</p> | <p>Conservare in frigorifero (tra 2° C e 8° C). Non congelare. Tenere la siringa preriempita nell'imballaggio esterno per proteggere il medicinale dalla luce.</p> |
| <p>E' PRESENTE LATTICE?</p> <p></p> | <p>Non vi è presenza di lattice nella specialità medicinale</p> |

A cura di

Sabrina Amendolagine, Angela Bove, Silvia Buongiorno, Maria Vittoria Lacaïta, Noemi Papadia, Cataldo Procacci, Miriam Rizzo

Coordinatori: Michele Lattarulo, Maria Ernestina Faggiano,

Con il contributo di Sonia Parazza, Giulia Dusi, Felice Musicco, Domenico Tarantino, Daniela Scala

Si ringrazia Cittadinanzattiva per aver collaborato a rendere il testo di più facile lettura per i cittadini