




Principio attivo: **DACLATASVIR DICLORIDRATO**

Farmaco: DAKLINZA®

(30 mg compresse rivestite)

E' un farmaco ad alto costo prescrivibile esclusivamente da medici specialisti appartenenti ad Aziende Ospedaliere e alle ASL in cui la Regione ha individuato i centri prescrittori.

<p>A COSA SERVE?</p>	<p>Daclastavir è usato per il trattamento dell'infezione cronica da virus dell'epatite C (HCV) negli adulti, in associazione con altri medicinali. Blocca l'azione di una proteina presente nel virus dell'epatite C, che è essenziale per la moltiplicazione del virus. Bloccando questa proteina, il medicinale impedisce al virus dell'epatite C di moltiplicarsi.</p>
<p>QUANDO NON LO PUOI UTILIZZARE?</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Se sei allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (il foglietto illustrativo riporta l'elenco di tutti gli eccipienti, tra cui il lattosio). • Se stai assumendo altri medicinali per il trattamento dell'infezione cronica da HCV, quali boceprevir, simeprevir, telaprevir. • Se sei in gravidanza o durante l'allattamento. • Se hai meno di 18 anni. <p>Per ulteriori informazioni contatta il tuo medico o il farmacista.</p>
<p>COME E QUANTE VOLTE LO PUOI UTILIZZARE DURANTE LA GIORNATA?</p> 	<p>La dose raccomandata è di 60 mg (due compresse) una volta al giorno.</p> <p>Deglutisci la compressa intera, con o senza cibo, senza masticarla, spezzarla o frantumarla perché ha un gusto molto amaro.</p> <p>Daclastavir deve essere impiegato in associazione ad altri medicinali per la cura dell'epatite C cronica, tra cui sofosbuvir, peginterferone alfa e ribavirina.</p> <p>La combinazione di medicinali da usare e la durata della terapia dipendono dal genotipo* del virus dell'epatite C responsabile dell'infezione e dalla natura dei problemi epatici a carico del paziente (cirrosi epatica o se il fegato non funziona correttamente).</p> <p><i>*Il genotipo rappresenta il profilo genetico del virus</i></p>
<p>COSA DEVI FARE SE DIMENTICHI DI ASSUMERE UNA DOSE?</p>	<p>Se dimentichi di assumere una dose e te ne ricordi entro 20 ore dall'orario abituale, prendi la compressa il prima possibile. Prendi quindi la dose successiva all'ora abituale. Se sono trascorse 20 o più ore, la dose dimenticata NON deve essere assunta e potrai prendere la dose successiva in base allo schema posologico abituale.</p> <p>Non prendere mai una dose doppia (due dosi nello stesso momento) per compensare quella dimenticata.</p>
<p>DEVI USARE PARTICOLARI METODI CONTRACCETTIVI?</p>	<p>In età fertile adotta misure contraccettive efficaci. Devi continuare l'uso di misure contraccettive per 5 settimane dopo il completamento della terapia.</p> <p>Se stai assumendo daclastavir con ribavirina, è bene che tu o il/la tuo/a partner adottiate misure contraccettive efficaci durante e per 6 mesi dopo la fine del trattamento.</p> <p>Chiedi al tuo medico ulteriori informazioni</p>
<p>DURANTE IL TRATTAMENTO DEVI FARE CONTROLLI EMATOLOGICI SPECIALISTICI?</p>	<p>No, il tuo medico deciderà quando sottoporti ad esami ematologici.</p>
<p>L'EVENTUALE INTERRUZIONE DEL TRATTAMENTO LA DEVI FARE A SCALARE?</p>	<p>No, ma è necessario consultare il medico prima di interrompere la terapia.</p>

<p>IN CASO DI SOVRADOSAGGIO QUALI SINTOMI POTRESTI AVERE?</p>	<p>Se accidentalmente assumi una dose maggiore di quella raccomandata, consulta immediatamente il medico, il pronto soccorso più vicino o il tuo Centro di Riferimento.</p> <p>Porta con te il flacone contenente le compresse, in modo da poter spiegare facilmente cosa hai assunto.</p>
<p>DAKLINZA® INTERAGISCE CON ALTRI FARMACI?</p> 	<p>Informa il medico o il farmacista se stai assumendo, hai recentemente assunto qualsiasi altro medicinale.</p> <p>In particolare informa il medico o il farmacista se ti viene indicato di assumere i seguenti farmaci perché sono controindicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • boceprevir, simeprevir, telaprevir per il trattamento dell'epatite cronica da HCV; • atazanavir e efavirenz per il trattamento dell'HIV; • ketoconazolo per il trattamento dell'infezione da funghi; • fenitoina, carbamazepina, oxcarbazepina o fenobarbital per trattare le crisi epilettiche; • rifampicina, rifabutina o rifapentina per il trattamento della tubercolosi; • desametasone, per il trattamento delle malattie allergiche e infiammatorie • erba di San Giovanni (<i>Hypericum perforatum</i>) che è un prodotto erboristico per l'ansia e la depressione); • midazolam e triazolam per il trattamento di ansia ed insonnia; • simvastatina e lovastatina per ridurre i livelli di colesterolo nel sangue.
<p>QUALI SONO GLI EFFETTI COLLATERALI CHE SI POTREBBERO PRESENTARE?</p>	<p>Se stai utilizzando daclastavir insieme a sofosbuvir (con o senza ribavirina), potresti avere i seguenti effetti collaterali: mal di testa, nausea, stanchezza, diminuzione dell'appetito, difficoltà a dormire, capogiri, respiro corto, vampate di calore, prurito, secchezza della pelle, perdita o assottigliamento insolito dei capelli, eruzione cutanea, diarrea, stitichezza, eccesso di gas nello stomaco o nell'intestino, bruciore e/o dolore di stomaco, vomito, tosse, congestione nasale (naso otturato), bocca secca, dolore alle articolazioni, dolore o dolorabilità muscolare non causato da esercizio fisico, depressione, ansia, irritabilità, riduzione dei globuli rossi (anemia).</p> <p>Se lo usi con peginterferone alfa e ribavirina, gli effetti collaterali segnalati sono gli stessi elencati nei fogli illustrativi di questi medicinali. I più comuni sono: diminuzione dell'appetito, difficoltà a dormire, mal di testa, respiro corto, nausea, stanchezza, malattia simil-influenzale, febbre, prurito, secchezza della cute, perdita o assottigliamento insolito dei capelli, eruzione cutanea, diarrea, tosse, dolore alle articolazioni, dolore o dolorabilità muscolare non causato da esercizio fisico, debolezza insolita, irritabilità, riduzione dei globuli rossi (anemia), riduzione dei globuli bianchi.</p> <p>Se si presentano altri disturbi che di solito non hai e pensi possano essere collegati all'uso di questo farmaco, informa il tuo medico e il tuo farmacista!</p> <p>Puoi effettuare anche tu la segnalazione sull'apposita scheda dedicata al "cittadino" scaricabile dal sito dell'AIFA: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/modalità-di-segnalazione-delle-sospette-reazioni-avverse-ai-medicinali ed inviarla per mail o per fax.</p>
<p>COME SI CONSERVA DAKLINZA®?</p>	<p>Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.</p>

A cura di

Sabrina Amendolagine, Silvia Buongiorno, Maria Vittoria Lacaita, Cataldo Procacci, Miriam Rizzo
Coordinatori: Michele Lattarulo, Maria Ernestina Faggiano

Con il contributo di Sonia Parazza, Rosalba Di Tommaso, Giulia Dusi, Felice Musicco, Domenico Tarantino, Daniela Scala

Si ringrazia Cittadinanzattiva per aver collaborato a rendere il testo di più facile lettura per i cittadini

Gennaio 2016