



## Principio attivo: **GLECAPREVIR + PIBRENTASVIR**

**Farmaco: MAVIRET®**

(100 mg / 40 mg compresse rivestite)

E' un farmaco ad alto costo prescrivibile esclusivamente da medici specialisti appartenenti ad Aziende Ospedaliere e alle ASL in cui la Regione ha individuato i centri prescrittori.

<p><b>A COSA SERVE?</b></p>	<p>Maviret® è un medicinale antivirale usato nel trattamento dell'epatite C cronica (a lungo termine) negli adulti.          Contiene due principi attivi, glecaprevir e pibrentasvir, in un'unica compressa, che agiscono insieme bloccando due differenti proteine necessarie al virus per crescere e riprodursi. In questo modo l'infezione viene definitivamente eliminata dall'organismo.</p>
<p><b>QUANDO NON LO PUOI UTILIZZARE?</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se sei allergico a glecaprevir, a pibrentasvir o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (il foglietto illustrativo riporta l'elenco di tutti gli eccipienti, tra i quali il <b>lattosio</b>),</li> <li>• Se hai meno di 18 anni,</li> <li>• se hai gravi problemi al fegato diversi dall'epatite C.</li> </ul> <p>L'uso in gravidanza non è raccomandato. Se stai allattando con latte materno, rivolgiti al medico prima di assumere Maviret®.</p> <p><b>Per ulteriori informazioni contatta il tuo medico o il farmacista.</b></p>
<p><b>COME E QUANTE VOLTE LO PUOI UTILIZZARE DURANTE LA GIORNATA?</b></p> 	<p>La dose raccomandata è di <b>tre compresse di Maviret® assunte contemporaneamente, una volta al giorno</b>. Le tre compresse contenute in un blister rappresentano la dose giornaliera.</p> <p><b>Dedeglutisci le compresse intere con il cibo senza masticarle, spezzarle o frantumarle.</b></p> <p>Se vomiti entro 3 ore dall'assunzione di Maviret®, prendi un'altra dose. Al contrario se vomiti dopo 3 ore dall'assunzione di Maviret®, non occorre prendere un'altra dose fino alla dose successiva all'ora stabilita.</p>
<p><b>COSA DEVI FARE SE DIMENTICHI DI ASSUMERE UNA DOSE?</b></p>	<p>Se dimentichi di assumere una dose e te ne ricordi entro 18 ore dall'orario previsto, assumi le tre compresse il prima possibile. Poi prendi la dose successiva all'ora abituale. Se sono trascorse 18 o più ore, devi aspettare e assumere la dose successiva in base allo schema posologico abituale.</p> <p><b>Non prendere mai una dose doppia (due dosi nello stesso momento) per compensare quella dimenticata.</b></p>
<p><b>DEVI USARE PARTICOLARI METODI CONTRACCETTIVI?</b></p>	<p>Se stai usando una pillola contraccettiva controlla sulla confezione se contiene etinilestradiolo e informa il medico. E' probabile che tu debba cambiare il contraccettivo, in quanto controindicato perché può determinare aumento degli enzimi del fegato (ALT).</p> <p>Anche gli anelli vaginali ed i cerotti ormonali possono contenere etinilestradiolo. Controlla la presenza sul foglietto illustrativo.</p> <p><b>Chiedi consiglio al medico su quali possono essere le misure contraccettive ottimali per te.</b></p>
<p><b>DURANTE IL TRATTAMENTO DEVI FARE CONTROLLI EMATOLOGICI SPECIALISTICI?</b></p>	<p>Il medico effettuerà delle analisi del sangue prima, durante e dopo il trattamento con Maviret® per decidere se è necessario continuare la cura e per quanto tempo, e per verificare se il trattamento è stato efficace ed è stata eliminata l'infezione.</p>
<p><b>L'EVENTUALE INTERRUZIONE DEL TRATTAMENTO LA DEVI FARE A SCALARE?</b></p>	<p>No, ma devi consultare il medico prima di sospendere il trattamento.</p> <p>È molto importante completare l'intero trattamento per dare al medicinale la possibilità di combattere l'infezione dovuta al virus dell'epatite C.</p>

<p><b>IN CASO DI SOVRADOSAGGIO QUALI SINTOMI POTRESTI AVERE?</b></p>	<p>Se accidentalmente assumi una dose maggiore di quella raccomandata, <b>consulta immediatamente il medico o recati al Pronto Soccorso più vicino o presso il tuo Centro di Riferimento.</b></p> <p>Porta con te la confezione del medicinale in modo da poter mostrare al medico che cosa hai assunto</p>
<p><b>MAVIRET® INTERAGISCE CON ALTRI FARMACI?</b></p>	<p>Informa il medico o il farmacista se stai assumendo o hai recentemente assunto (almeno nell'arco degli ultimi 6 mesi) qualsiasi altro medicinale.</p> <p>Informa il medico o il farmacista se ti viene indicato di assumere i seguenti farmaci perché sono controindicati o richiedono particolari precauzioni nell'uso concomitante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alcuni farmaci per il trattamento dell'infezione da HIV (il foglietto illustrativo riporta l'elenco dei farmaci);</li> <li>• carbamazepina, fenobarbitale, fenitoina, primidone (utilizzati per l'epilessia);</li> <li>• medicinali contenenti etinilestradiolo (ad esempio i contraccettivi);</li> <li>• rifampicina (antibiotico usato nel trattamento delle infezioni batteriche);</li> <li>• erba di San Giovanni o <i>Hypericum perforatum</i>, (un medicinale a base vegetale usato per trattare la depressione);</li> <li>• ciclosporina e tacrolimus (per prevenire il rigetto di un organo trapiantato);</li> <li>• digossina (usata per trattare determinate malattie del cuore);</li> <li>• atorvastatina, simvastatina, fluvastatina, lovastatina, pitavastatina, pravastatina, rosuvastatina( per ridurre i livelli di colesterolo nel sangue);</li> <li>• warfarin, dabigatran etexilato e altri medicinali simili (usati per prevenire i coaguli di sangue).</li> </ul>
<p><b>QUALI SONO GLI EFFETTI COLLATERALI CHE SI POTREBBERO PRESENTARE?</b></p>	<p>Effetti indesiderati molto comuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• affaticamento,</li> <li>• mal di testa.</li> </ul> <p>Effetti indesiderati comuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nausea,</li> <li>• diarrea,</li> <li>• sensazione di debolezza o mancanza di energia (astenia).</li> </ul> <p><b>Se si presentano altri disturbi che di solito non hai e pensi possano essere collegati all'uso di questo farmaco, informa il tuo medico e il tuo farmacista!</b></p> <p>Puoi effettuare anche tu la segnalazione secondo una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• compilando la scheda dedicata al cittadino scaricabile dal sito dell'AIFA e inviandola al Responsabile di Farmacovigilanza della tua Azienda Sanitaria di residenza (<a href="http://www.aifa.gov.it/content/come-segnalareuna-sospetta-reazione-avversa">http://www.aifa.gov.it/content/come-segnalareuna-sospetta-reazione-avversa</a>);</li> <li>• direttamente online sul sito <a href="http://www.vigifarmaco.it">www.vigifarmaco.it</a> seguendo la procedura guidata.</li> </ul>
<p><b>COME DEVI CONSERVARE MAVIRET®?</b></p>	<p>Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.</p> <p>Conservalo nella confezione originale fino al momento dell'uso per proteggere il medicinale dall'umidità</p>

A cura di  
Maria Gagliardo

Coordinatore: Maria Ernestina Faggiano

Con il contributo di Sonia Parazza, Brunella Piro, Domenico Tarantino,  
Daniela Scala

*Si ringrazia Cittadinanza attiva per aver collaborato a rendere il testo di più facile lettura per i cittadini*