




Principio attivo: **DASATINIB**

Farmaco: **SPRYCEL®**

(20 mg, 50 mg, 70mg, 80mg, 100mg, 140mg compresse rivestite)

E' un farmaco ad alto costo prescrivibile esclusivamente da medici specialisti appartenenti ad Aziende Ospedaliere e alle ASL in cui la Regione ha individuato i centri prescrittori

<p>A COSA SERVE?</p>	<p>Dasatinib è utilizzato per il trattamento di un tipo di leucemia chiamata leucemia mieloide cronica cromosoma Philadelphia positivo (LMC Ph+)*. La LMC è un tumore del sangue che fa produrre al corpo troppi globuli bianchi anormali.</p> <p>Dasatinib inibisce la crescita delle cellule leucemiche.</p> <p>Dasatinib è utilizzato in pazienti con LMC Ph+ di nuova diagnosi (che effettuano il primo trattamento) o in pazienti con LMC Ph+ che non hanno più alcun beneficio da precedenti trattamenti incluso imatinib. E' usato anche in pazienti che hanno manifestato gravi effetti indesiderati a seguito di precedenti trattamenti e che non possono continuare ad assumerli.</p> <p>Dasatinib è anche un trattamento per gli adulti affetti da leucemia linfoblastica acuta (LLA) con cromosoma Philadelphia positivo (Ph+), quando i pazienti sono intolleranti o quando la loro malattia non risponde, ad altri trattamenti. In individui con LLA, i globuli bianchi chiamati linfociti si moltiplicano molto velocemente e vivono molto a lungo.</p> <p><i>* Il cromosoma Ph+, nato dalla riorganizzazione di alcuni cromosomi del paziente, produce un enzima, detto chinasi Bcr-Abl, che porta allo sviluppo della leucemia.</i></p>
<p>QUANDO NON LO PUOI UTILIZZARE?</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Se sei allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (il foglietto illustrativo riporta l'elenco di tutti gli eccipienti, tra cui il lattosio). • Se sei in gravidanza o durante l'allattamento. • Se hai meno di 18 anni. <p>Per ulteriori informazioni contatta il tuo medico o il farmacista.</p>
<p>COME E QUANTE VOLTE LO PUOI UTILIZZARE DURANTE LA GIORNATA?</p> 	<p>LMC in fase cronica: la dose iniziale raccomandata è di 100 mg una volta al giorno.</p> <p>LMC in fase avanzata (accelerata o blastica) e per LLA: la dose è di 140 mg una volta al giorno.</p> <p>il medico ti fornirà le informazioni più adeguate per la tua condizione e, a seconda di come risponderai al trattamento, potrà consigliare una dose maggiore o minore, o anche una breve interruzione del trattamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non assumere mai Dasatinib insieme al pompelmo o succo di pompelmo • Assumi le compresse alla stessa ora ogni giorno. • Deglutisci le compresse intere senza frantumarle. <p>Le compresse possono essere assunte vicino o lontano dai pasti.</p>
<p>COSA DEVI FARE SE DIMENTICHI DI ASSUMERE UNA DOSE?</p>	<p>Se dimentichi di assumere una dose, la dose dimenticata NON va assunta. Potrai continuare a prendere la dose successiva in base allo schema posologico abituale.</p> <p>Non prendere mai una dose doppia (due dosi nello stesso momento) per compensare quella dimenticata.</p>
<p>DEVI USARE PARTICOLARI METODI CONTRACCETTIVI?</p>	<p>Per le donne e gli uomini in età fertile è necessario usare misure contraccettive efficaci durante il trattamento con dasatinib.</p> <p>Chiedi al tuo medico ulteriori informazioni</p>
<p>DURANTE IL TRATTAMENTO DEVI FARE CONTROLLI EMATOLOGICI SPECIALISTICI?</p>	<p>E' necessario monitorare alcuni esami del sangue indicati dal medico, tra cui i livelli di piastrine (componenti che favoriscono la coagulazione del sangue) e di neutrofili (i globuli bianchi che combattono le infezioni) nel sangue</p>
<p>L'EVENTUALE INTERRUZIONE DEL TRATTAMENTO LA DEVI FARE A SCALARE?</p>	<p>No, ma è necessario consultare il medico prima di interrompere la terapia.</p>

<p>IN CASO DI SOVRADOSAGGIO QUALI SINTOMI POTRESTI AVERE?</p>	<p>Se accidentalmente assumi una dose maggiore di quella raccomandata, consulta immediatamente il medico, il pronto soccorso più vicino o il tuo Centro di Riferimento.</p> <p>Porta con te il flacone contenente le compresse, in modo da poter spiegare facilmente cosa hai assunto.</p>
<p>SPRYCEL® INTERAGISCE CON ALTRI FARMACI?</p> 	<p>Informa il medico o il farmacista se stai assumendo o hai recentemente assunto qualsiasi altro medicinale.</p> <p>In particolare informa il medico o il farmacista se ti viene indicato di assumere i seguenti farmaci perché sono controindicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eritromicina, claritromicina, telitromicina per le infezioni da batteri; • ketoconazolo, itraconazolo per le infezioni da funghi; • ritonavir per il trattamento dell'infezioni da HIV (AIDS); • desametasone che è un corticosteroide usato come antiinfiammatorio e per prevenire reazioni allergiche; • fenitoina, carbamazepina, fenobarbital per le crisi epilettiche; • rifampicina per la tubercolosi; • famotidina, omeprazolo, medicinali che bloccano la produzione di acido nello stomaco; • erba di San Giovanni (<i>Hypericum perforatum</i>) che è un prodotto erboristico per l'ansia e la depressione; <p>Non assumere medicinali che neutralizzano gli acidi dello stomaco (antiacidi come alluminio idrossido o magnesio idrossido) nelle 2 ore precedenti o nelle 2 ore successive all'assunzione di dasatinib.</p> <p>Informa il medico se stai assumendo medicinali che fluidificano il sangue o che evitano la formazione di coaguli (per esempio il warfarin o la cardioaspirina).</p>
<p>QUALI SONO GLI EFFETTI COLLATERALI CHE SI POTREBBERO PRESENTARE?</p>	<p>Effetti indesiderati molto comuni (possono interessare più di 1 persona su 10)</p> <ul style="list-style-type: none"> • infezioni (comprende infezioni batteriche, virali e fungine) • respiro corto • problemi dell'apparato digerente: diarrea, nausea, vomito • eruzione cutanea, febbre, gonfiore del viso, delle mani e dei piedi, mal di testa, sensazione di stanchezza o debolezza, emorragia • dolore ai muscoli, dolore alla pancia (addominale) • esami di laboratorio e strumentali potrebbero dimostrare: bassa conta delle piastrine, bassa conta dei globuli bianchi (neutropenia), anemia, presenza di liquido nei polmoni (versamento) <p>Se si presentano altri disturbi che di solito non hai e pensi possano essere collegati all'uso di questo farmaco, informa il tuo medico e il tuo farmacista!</p> <p>Puoi effettuare anche tu la segnalazione sull'apposita scheda dedicata al "cittadino" scaricabile dal sito dell'AIFA: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/modalità-di-segnalazione-delle-sospette-reazioni-avverse-ai-medicinali ed inviarla per mail o per fax.</p>
<p>COME DEVI CONSERVARE SPRYCEL®?</p>	<p>Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.</p>

A cura di

Sabrina Amendolagine, Silvia Buongiorno, Maria Vittoria Lacaita, Cataldo Procacci, Miriam Rizzo
 Coordinatori: Michele Lattarulo, Maria Ernestina Faggiano

Con il contributo di Sonia Parazza, Rosalba Di Tommaso, Giulia Dusi, Felice Musicco, Domenico Tarantino, Daniela Scala

Si ringrazia Cittadinanzattiva per aver collaborato a rendere il testo di più facile lettura per i cittadini