


Principio attivo: DELTA-9-TETRAIDROCANNABINOLO/CANNABIDILOLO

Farmaco: SATIVEX®

(Spray per mucosa orale)

E' un farmaco ad alto costo prescrivibile esclusivamente da medici specialisti appartenenti ad Aziende Ospedaliere e alle ASL in cui la Regione ha individuato i centri proscrittoria

<p>A COSA SERVE?</p>	<p>Sativex® è uno spray orale che contiene estratti di <i>cannabis sativa</i> detti cannabinoidi.</p> <p>E'usato per alleviare i sintomi di rigidità muscolare in pazienti con sclerosi multipla. Sativex® viene usato quando altri medicinali non sono efficaci nel dare sollievo alla rigidità muscolare.</p>																																																															
<p>QUANDO NON LO PUOI UTILIZZARE?</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • se sei allergico agli estratti di cannabis o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (il foglietto illustrativo riporta l'elenco di tutti gli eccipienti), tra cui il propilen glicole, che può causare irritazione, l' etanolo e l'olio di menta piperita; • se tu o un tuo parente di primo grado (genitori, zii, nonni, sorelle,fratelli) siete affetti da problemi di salute mentale quali schizofrenia, psicosi o da altri disturbi psichiatrici; • durante l'allattamento al seno. <p>Se viaggi all'estero: verifica se puoi portare legalmente questo medicinale nei paesi che intendi visitare. In alcuni paesi potrebbe essere proibito guidare quando si assume Sativex®.</p> <p>L'uso del farmaco senza necessità terapeutica, per chi svolge attività sportiva, costituisce doping e può determinare comunque positività ai test anti-doping.</p>																																																															
<p>COME E QUANTE VOLTE LO PUOI UTILIZZARE DURANTE LA GIORNATA?</p> 	<p>Devi cercare di prendere Sativex® sempre a stomaco pieno oppure sempre a stomaco vuoto in modo da avere sempre lo stesso effetto.</p> <p>Agita delicatamente il flacone spray prima dell'uso. Usa Sativex® sulle pareti della bocca o sotto la lingua seguendo la tabella di seguito:</p> <table border="1" data-bbox="534 1232 1396 1713"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Giorno</th> <th colspan="3">Numero di spruzzi</th> </tr> <tr> <th>Spruzzi al mattino (tra il risveglio e mezzogiorno)</th> <th>Spruzzi alla sera (tra le 16 e l'ora di coricarsi)</th> <th>Totale spruzzi ogni giorno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1° giorno</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>2° giorno</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>3° giorno</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>4° giorno</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>5° giorno</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>6° giorno</td><td>1</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>7° giorno</td><td>1</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>8° giorno</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td></tr> <tr><td>9° giorno</td><td>2</td><td>5</td><td>7</td></tr> <tr><td>10° giorno</td><td>3</td><td>5</td><td>8</td></tr> <tr><td>11° giorno</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td></tr> <tr><td>12° giorno</td><td>4</td><td>6</td><td>10</td></tr> <tr><td>13° giorno</td><td>4</td><td>7</td><td>11</td></tr> <tr><td>14° giorno</td><td>5</td><td>7</td><td>12</td></tr> </tbody> </table> <p>Non appena raggiungi il numero di spruzzi più adatto a te, per alleviare i sintomi di rigidità muscolare, non aumentare più il dosaggio e utilizza lo stesso numero di spruzzi ogni giorno.</p> <p>Se inizi a sentire degli effetti indesiderati (generalmente capogiri) usa uno spruzzo in meno ogni giorno finché non trovi il miglior sollievo, con il minor numero di effetti indesiderati.</p> <p>Lascia sempre trascorrere almeno quindici minuti tra uno spruzzo e l'altro. Non usare più di dodici spruzzi al giorno, a meno che il medico non lo consigli in modo specifico.</p> <p>Cambia sito di somministrazione ogni volta che si utilizza il prodotto.</p>	Giorno	Numero di spruzzi			Spruzzi al mattino (tra il risveglio e mezzogiorno)	Spruzzi alla sera (tra le 16 e l'ora di coricarsi)	Totale spruzzi ogni giorno	1° giorno	0	1	1	2° giorno	0	1	1	3° giorno	0	2	2	4° giorno	0	2	2	5° giorno	1	2	3	6° giorno	1	3	4	7° giorno	1	4	5	8° giorno	2	4	6	9° giorno	2	5	7	10° giorno	3	5	8	11° giorno	3	6	9	12° giorno	4	6	10	13° giorno	4	7	11	14° giorno	5	7	12
Giorno	Numero di spruzzi																																																															
	Spruzzi al mattino (tra il risveglio e mezzogiorno)	Spruzzi alla sera (tra le 16 e l'ora di coricarsi)	Totale spruzzi ogni giorno																																																													
1° giorno	0	1	1																																																													
2° giorno	0	1	1																																																													
3° giorno	0	2	2																																																													
4° giorno	0	2	2																																																													
5° giorno	1	2	3																																																													
6° giorno	1	3	4																																																													
7° giorno	1	4	5																																																													
8° giorno	2	4	6																																																													
9° giorno	2	5	7																																																													
10° giorno	3	5	8																																																													
11° giorno	3	6	9																																																													
12° giorno	4	6	10																																																													
13° giorno	4	7	11																																																													
14° giorno	5	7	12																																																													



COSA DEVI FARE SE DIMENTICHI DI ASSUMERE UNA DOSE?	Applica uno spruzzo appena possibile o quando ne senti il bisogno, ma NON somministrare due spruzzi nello stesso momento per recuperare la dose dimenticata.
DEVI UTILIZZARE PARTICOLARI MISURE CONTRACCETTIVE?	Sativex® non deve essere usato durante la gravidanza, a meno che il medico non lo raccomandi in modo specifico. Sia le donne che gli uomini che prendono Sativex® devono usare un metodo contraccettivo sicuro per tutta la durata del trattamento e nei tre mesi successivi alla sua sospensione.
DURANTE IL TRATTAMENTO DEVI FARE CONTROLLI SPECIALISTICI?	NO. Prima di iniziare la terapia con Sativex® farai un trattamento di prova della durata di quattro settimane. Potrai continuare il trattamento soltanto se, dopo queste quattro settimane, avrai ottenuto un significativo miglioramento della rigidità muscolare.
L'EVENTUALE INTERRUZIONE DEL TRATTAMENTO LA DEVI FARE A SCALARE?	NO. Contatta il tuo medico prima di interrompere il trattamento. L'interruzione improvvisa può influire temporaneamente sul sonno, sull'appetito o sulle emozioni. Se interrompi l'assunzione di Sativex®, di solito la rigidità muscolare ritorna gradualmente.
IN CASO DI SOVRADOSAGGIO QUALI SINTOMI POTRESTI AVERE?	Allucinazioni visive e uditive, capogiro, sonnolenza o confusione, sentire un cambiamento della frequenza cardiaca. Contatta il tuo medico o il farmacista in caso di sovradosaggio.
SATIVEX® INTERAGISCE CON ALTRI FARMACI, CIBI O BEVANDE? 	Informa il medico o il farmacista se stai assumendo o hai recentemente assunto qualsiasi altro medicinale. In particolare: - medicine che riducono l'ansia o che ti fanno dormire meglio - medicine per rilassare i muscoli, come baclofen o diazepam possono aumentare gli effetti collaterali di Sativex®. L'alcol deve essere evitato quando si assume Sativex®, specialmente all'inizio del trattamento o quando si cambia la dose, perché può aumentare i suoi effetti collaterali.
QUALI SONO GLI EFFETTI COLLATERALI CHE SI POTREBBERO PRESENTARE?	Gli effetti indesiderati sono più probabili all'inizio della terapia, generalmente sono lievi e scompaiono in pochi giorni. Molto comuni: capogiri o senso di stanchezza. Puoi effettuare anche tu la segnalazione sull'apposita scheda dedicata al "cittadino" scaricabile dal sito dell'AIFA: http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/modalità-di-segnalazione-delle-sospette-reazioni-avverse-ai-medicinali ed inviarla per mail o per fax. Se si presentano altri disturbi che di solito non hai e pensi possano essere collegati all'uso di questo farmaco, informa il tuo medico e il tuo farmacista!
COME DEVI CONSERVARE SATIVEX®?	Conserva il medicinale in frigorifero (2°C-8°C) prima dell'uso. Non congelare. Una volta aperto il farmaco può essere conservato a temperatura ambiente (25°C) fino a sei settimane.

A cura di

Sabrina Amendolagine, Silvia Buongiorno, Maria Vittoria Lacaïta, Cataldo Procacci, Miriam Rizzo
Coordinatori: Michele Lattarulo, Maria Ernestina Faggiano,

Con il contributo di Sonia Parazza, Giulia Dusi, Rosalba Di Tommaso Felice Musicco, Domenico Tarantino, Daniela Scala

Si ringrazia Cittadinanzattiva per aver collaborato a rendere il testo di più facile lettura per i cittadini

Luglio 2015