

Principio attivo: **ETANERCEPT**

Farmaco: **ENBREL®**

(25 mg o 50 mg siringa preriempita, 50 mg penna preriempita)

E' un farmaco ad alto costo prescrivibile esclusivamente da medici specialisti appartenenti ad Aziende Ospedaliere e alle ASL in cui la Regione ha individuato i centri proscrittori

<p>A COSA SERVE?</p>	<p>E' un medicinale biologico* ottenuto da due proteine umane. E' prodotto con un metodo noto come "tecnologia del DNA ricombinante. Esso blocca l'attività di un'altra proteina che provoca l'infiammazione nell'organismo. Può essere utilizzato per il trattamento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artrite reumatoide • Artrite psoriasica • Artrite idiopatica giovanile • Spondilite anchilosante • Psoriasi a placche • Psoriasi a placche pediatrica <p><small>* Un medicinale biologico è un prodotto il cui principio attivo è una sostanza prodotta, o estratta, da un sistema biologico (di origine umana, animale o da colture cellulari) attraverso procedimenti sofisticati di laboratorio.</small></p>
<p>QUANDO NON LO PUOI UTILIZZARE?</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • se hai un'infezione attiva (comprese le infezioni croniche o localizzate) • se hai o sei a rischio di sviluppare infezioni gravi del sangue (sepsi) • se sei allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti (il foglietto illustrativo riporta l'elenco di tutti gli eccipienti) • se sei affetto da Tubercolosi o da Varicella Zoster • se sei in gravidanza e durante l'allattamento <p style="text-align: center;">Per ulteriori informazioni contatta il tuo medico o il farmacista</p>
<p>COME E QUANTE VOLTE LO PUOI UTILIZZARE DURANTE LA GIORNATA?</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • La penna o la siringa deve essere somministrata per iniezione sottocutanea. • Prima dell'iniezione devi attendere che la siringa/penna di Etanercept raggiunga la temperatura ambiente (approssimativamente dai 15 ai 30 minuti). <p>La posologia standard è di 25 mg due volte a settimana o 50 mg una volta a settimana.</p> <p>In alcuni casi si può iniziare con un trattamento di 50 mg due volte a settimana, ma tale trattamento dovrà durare solo per 12 settimane, dopo di che si continuerà con la posologia standard.</p>
<p>COSA DEVI FARE SE DIMENTICHI DI ASSUMERE UNA DOSE?</p>	<p>Se dimentichi una dose, somministrala non appena ti accorgi della dimenticanza. Se la dose successiva è programmata per il giorno successivo, non assumere più la dose che hai dimenticato e assumi direttamente la dose successiva nel giorno successivo. Non prendere mai una dose doppia (due dosi nello stesso giorno) per compensare la dimenticanza della dose.</p>
<p>DEVI UTILIZZARE PARTICOLARI MISURE CONTRACCETTIVE?</p>	<p>In età fertile devi adottare precauzioni contraccettive sicure per tutta la durata del trattamento e nelle tre settimane successive alla sua sospensione.</p>
<p>L'EVENTUALE INTERRUZIONE DEL TRATTAMENTO LA DEVI FARE A SCALARE?</p>	<p>No, ma devi consultare il medico prima di interrompere la terapia.</p>

<p>IN CASO DI SOVRADOSAGGIO QUALI SINTOMI POTRESTI AVERE?</p>	<p>In caso di somministrazione di un dosaggio maggiore a quello dovuto, non sono stati evidenziati effetti collaterali gravi.</p> <p>Contatta il tuo medico o il farmacista in caso di sovradosaggio.</p>
<p>ENBREL® INTERAGISCE CON ALTRI FARMACI?</p> 	<p>L' Etanercept non deve essere preso in concomitanza con farmaci contenenti come principio attivo anakinra o abatacept o sulfasalazina</p> <p>I vaccini non devono essere somministrati in concomitanza con Etanercept.</p> <p>Per ulteriori informazioni contatta il tuo medico o il farmacista</p>
<p>QUALI SONO GLI EFFETTI COLLATERALI CHE SI POTREBBERO PRESENTARE?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reazioni nel sito d'iniezione: prurito, arrossamento, sanguinamento, gonfiore e dolore. • Infezioni delle alte vie respiratorie, bronchiti, cistiti, infezioni della pelle. • Reazioni allergiche con prurito e febbre. <p>Generalmente dopo il primo mese di trattamento queste reazioni non si manifestano più così spesso.</p> <p>Con Etanercept sono state segnalate anche reazioni avverse gravi tra cui infezioni gravi e tumori maligni.</p> <p>Puoi effettuare anche tu la segnalazione di reazione avversa sull'apposita scheda dedicata al "cittadino" scaricabile dal sito dell'AIFA: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/modalità-di-segnalazione-delle-sospette-reazioni-avverse-ai-medicinali e inviarla per mail o per fax.</p> <p>Se si presentano altri disturbi che di solito non hai e pensi possano essere collegati all'uso di questo farmaco, informa il tuo medico e il tuo farmacista!</p>
<p>COME DEVI CONSERVARE ENBREL®?</p>	<p>Conservare in frigorifero (tra 2° C e 8° C). Non congelare.</p> <p>Etanercept può essere conservato ad una temperatura massima di 25° C fino a 4 settimane, per una sola volta; dopo tale periodo non può essere riposto nuovamente in frigo. Se non utilizzato nelle 4 settimane fuori dal frigo, Etanercept deve essere gettato.</p> <p>Tenere le siringhe preriempite nell'imballaggio esterno per proteggerle dalla luce.</p>
<p>E' PRESENTE LATTICE?</p> 	<p>Il cappuccio dell'ago della siringa preriempita contiene lattice (gomma naturale essiccata) che può causare reazioni di ipersensibilità quando Etanercept è maneggiato o somministrato a persone con sensibilità accertata o presunta al lattice</p>

A cura di

Sabrina Amendolagine, Angela Bove, Silvia Buongiorno, Maria Vittoria Lacaïta, Noemi Papadia, Cataldo Procacci, Miriam Rizzo
 Coordinatori: Michele Lattarulo, Maria Ernestina Faggiano,

Con il contributo di Sonia Parazza, Giulia Dusi, Felice Musicco, Domenico Tarantino, Daniela Scala

Si ringrazia Cittadinanzattiva per aver collaborato a rendere il testo di più facile lettura per i cittadini

Giugno 2015