

Principio attivo: **BOCEPREVIR**

Farmaco: VICTRELIS®

(200 mg capsule rigide)

E' un farmaco ad alto costo prescrivibile esclusivamente da medici specialisti appartenenti ad Aziende Ospedaliere e alle ASL in cui la Regione ha individuato i centri proscrittori

<p>A COSA SERVE?</p>	<p>Victrelis® contiene il principio attivo boceprevir che aiuta a combattere l'infezione da epatite C cronica di lungo termine causata dal virus dell'epatite C genotipo 1*.</p> <p>Boceprevir ferma la replicazione del virus dell'epatite C e contribuisce in questo modo a ridurre la quantità nell'organismo.</p> <p>Boceprevir viene usato in associazione con peginterferone alfa e ribavirina, nei pazienti con malattia epatica compensata che non sono stati trattati in precedenza o che non hanno risposto a una precedente terapia. La malattia epatica compensata si ha quando il fegato è danneggiato, ma funziona normalmente.</p> <p><i>*Il genotipo si riferisce al profilo genetico del virus</i></p>
<p>QUANDO NON LO PUOI UTILIZZARE?</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Se sei allergico a boceprevir o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (il foglietto illustrativo riporta l'elenco di tutti gli eccipienti, es. lattosio e sodio); • Durante l'allattamento; • In gravidanza (boceprevir deve essere usato insieme a ribavirina che può essere molto dannosa per il feto); • Se hai insufficienza epatica, epatite autoimmune (un'epatite causata da un disturbo del sistema immunitario), o un altro problema epatico (oltre all'epatite C). <p>Per ulteriori informazioni contatta il tuo medico o il farmacista.</p>
<p>COME E QUANTE VOLTE LO PUOI UTILIZZARE DURANTE LA GIORNATA?</p> 	<p>La dose raccomandata di boceprevir è 4 capsule tre volte al giorno (un totale di 12 capsule al giorno).</p> <p>Prendi le capsule al mattino, pomeriggio e sera insieme a un pasto o uno spuntino leggero. L'uso senza cibo potrebbe compromettere la possibilità di successo del trattamento.</p> <p>Boceprevir è preso sempre in associazione con peginterferone alfa e ribavirina. La durata della somministrazione di questi medicinali dipenderà dalla risposta e dal piano di trattamento.</p>
<p>COSA DEVI FARE SE DIMENTICHI DI ASSUMERE UNA DOSE?</p>	<p>Se dimentichi di prendere una dose e mancano più di 2 ore all'orario della dose successiva, prendi la dose che hai dimenticato. In seguito continua a prendere le capsule come sempre.</p> <p>Se invece mancano meno di 2 ore all'orario della dose successiva, salta la dose che hai dimenticato.</p> <p>Non prendere una dose doppia (due dosi nello stesso momento) per compensare la dimenticanza della dose.</p> <p>Contatta il tuo medico per sapere come proseguire con il trattamento.</p>
<p>DEVI UTILIZZARE PARTICOLARI MISURE CONTRACCETTIVE?</p>	<p>Boceprevir deve essere impiegato in associazione a ribavirina. La ribavirina può essere particolarmente dannosa per il feto.</p> <p>Le pazienti di sesso femminile devono utilizzare un metodo contraccettivo efficace durante il trattamento e per 4 mesi dopo la conclusione. I pazienti di sesso maschile o le loro partner di sesso femminile devono utilizzare un metodo contraccettivo efficace durante il trattamento e per 7 mesi dopo la conclusione.</p>

<p>IN CASO DI SOVRADOSAGGIO QUALI SINTOMI POTRESTI AVERE?</p>	<p>Se prendi più boceprevir di quanto devi, informa il medico o recati immediatamente al più vicino pronto soccorso ospedaliero.</p> <p>Contatta il tuo medico o il farmacista in caso di sovradosaggio.</p>
<p>VICTRELIS® INTERAGISCE CON ALTRI FARMACI?</p> 	<p>Informa il medico o il farmacista se stai assumendo, hai recentemente assunto qualsiasi altro medicinale. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • midazolam, triazolam (per dormire e/o alleviare l'ansia) • bepridil (antiaritmico), • pimozone (antipsicotico) • lumefantrina, alofantrina (antimalarici) • simvastatina, lovastatina (per ridurre il colesterolo) • quetiapina (per la schizofrenia, il disturbo bipolare e il disturbo depressivo maggiore) • diidroergotamina, ergonovina, ergotamina, metilergonovina (per il mal di testa) • alfuzosina, silodosina (per l'ipertrofia prostatica benigna) • inibitori della tirosina chinasi – una particolare classe di medicinali usati come antitumorali. • inibitori delle proteasi (per il virus dell'HIV) <p>Per ulteriori informazioni contatta il tuo medico o il farmacista.</p>
<p>QUALI SONO GLI EFFETTI COLLATERALI CHE SI POTREBBERO PRESENTARE?</p>	<p>Interrompi il trattamento con boceprevir e consulta immediatamente un medico se noti la comparsa di uno dei seguenti effetti indesiderati in quanto potrebbe essere necessario un trattamento medico urgente: difficoltà a respirare o a deglutire, sibili, orticaria, prurito, gonfiore del volto, degli occhi, delle labbra, della lingua o della gola - questi sono segni di una reazione allergica.</p> <p>Gli effetti indesiderati molto comuni comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mal di testa, brividi, febbre, sintomi similinfluenzali, vertigini, spossatezza, non riuscire a dormire, appetito scarso, perdita di peso, respiro corto - tosse, bocca secca, senso del gusto strano - pelle secca, prurito, eruzione cutanea, perdita/assottigliamento capelli - debolezza, articolazioni gonfie e/o doloranti, dolore muscolare - diarrea, vomito - ansia, depressione, irritabilità, tensione e irrequietezza - anemia, neutropenia (ridotto numero di globuli bianchi). <p>Puoi effettuare anche tu la segnalazione sull'apposita scheda dedicata al "cittadino" scaricabile dal sito dell'AIFA: http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/modalità-di-segnalazione-delle-sospette-reazioni-avverse-ai-medicinali ed inviarla per mail o per fax.</p> <p>Se si presentano altri disturbi che di solito non hai e pensi possano essere collegati all'uso di questo farmaco, informa il tuo medico e il tuo farmacista!</p>
<p>COME DEVI CONSERVARE VICTRELIS®?</p>	<p>Puoi conservare il farmaco in frigorifero (2°C – 8°C) fino alla data di scadenza oppure lo puoi conservare fuori dal frigorifero a temperatura inferiore a 30°C per un periodo di non più di 3 mesi.</p>

A cura di

Michele Lattarulo, Maria Ernestina Faggiano, Sabrina Amendolagine, Silvia Buongiorno,
Maria Vittoria Lacaita, Cataldo Procacci, Miriam Rizzo

Con il contributo di

Sonia Parazza, Rosalba Di Tommaso, Giulia Dusi, Felice Musicco, Domenico Tarantino, Daniela Scala

Si ringrazia Cittadinanzattiva per aver collaborato a rendere il testo di più facile lettura per i cittadini

Giugno 2015